

# LIFT<sup>®</sup> Kit

## STERILE UROGENITAL IMPLANTS: SUBURETHRAL SUPPORT TAPE

en	Instructions for use <b>Surgical Procedure</b>	Page	2 28
fr	Notice d'instructions <b>Technique Opératoire</b>	Page	4 28
de	Gebrauchsanweisung <b>Operationstechnik</b>	Seite	6 28
it	Istruzioni per l'uso <b>Técnica Operatoria</b>	Pagina	8 28
es	Instrucciones de uso <b>Técnica Operatoria</b>	Pagina	10 28
pt	Instruções de uso <b>Técnica Operatoria</b>	Pagina	12 28
ελ	Οδηγίες χρήσης Χειρουργική Διαδικασία	σελίδα	14 28
hu	Használati útmutató <b>Sebészeti eljárás</b>	oldal	16 28
nl	Gebruiksinstructies <b>Chirurgische procedure</b>	Page	18 28
pl	Instrukcja obsługi <b>Technika operacyjna</b>	Strona	20 28
sk	Návod na použíte <b>Chirurgický postup</b>	Strana	22 28
cs	Návod k použití <b>Chirurgický postup</b>	Strana	24 28
ro	Instructiuni de utilizare <b>Procedura chirurgicala</b>	Pagina	26 28



**COUSIN BIOTECH**  
8, rue de l'Abbé Bonpain  
59117 Wervicq-Sud - FRANCE  
Tél. : +33 (0) 3 20 14 41 20  
Fax : +33 (0) 3 20 14 40 13

[www.cousin-biotech.com](http://www.cousin-biotech.com)



Made in France

Date de marquage CE: Aout 2002



**NOT219/230525**

Version du 25/05/2023

This release is the last update of the instructions for use and replaces the previous edition

**LIFT®Kit**  
**Suburethral support tape**

**DESCRIPTION**

The LIFT® kit comprises a tape and a winged guide, 3 ancillary devices (1 pair for the transobturator technique and 1 for the retropubic and suprapubic approach).

They are single use and delivered sterile.

The LIFT® prosthesis consists of a tape of knitted monofilament polypropylene, packaged in a plastic sheath.

It is prolonged by self-tightening loops for placing.

The ancillary devices have different shapes depending on the chosen approach: 1 curved needle for the retropubic and suprapubic approach, a pair of helical needles for the in-out and out-in transobturator approaches.

The end of the ancillary needles has a slot for fixing self-tightening loops.

A single-use, sterile guide is supplied with the implant to secure the passage of the ancillary device during the in-out transobturator approach.

When placing the self-tightening loop in the slot, always make sure it is as tight as possible and that the thread is in the slot designed for this purpose so that the prosthesis does not come apart from the ancillary when passing in the patient's tissues. (See figure 1 below)




Fig 1

**MATERIALS**

- **Prosthesis:** polypropylene (knitted monofilament)
  - **Thread:** Polyethylene terephthalate + biocompatible dye + dimethyl siloxane
  - **Ancillary device:** Stainless steel needle, polyoxymethylene handle.
  - **Guide:** Liquid crystal polymer + biocompatible dye.
- Not human nor animal origin - Non absorbable.**

**INDICATIONS**

The LIFT® prosthesis is designed for use as a suburethral support tape for the surgical treatment by vaginal approach in women.

**PERFORMANCE**

These biocompatible, not biodegradable prostheses cause reactive fibrosis that produces additional urethral support.

These prostheses are easy to insert due to their specially designed shape, excellent flexibility and optimum, rapid colonization and integration.

**CONTRAINDICATIONS**

Do not implant in the following cases:

- Allergy to any one of the components
- For women receiving anticoagulant therapy.
- Urinary tract infection
- Pregnant women
- Skeletally-immature children

Any patient who could possibly be pregnant should be warned that pregnancy may abolish the benefit of the procedure.

**SIDE EFFECTS**

As with all medical implants, this product may lead to side effects, such as:

Perforation or damage to blood vessels, bladder, urethra, rectum, intraperitoneal organs or nerves.

As with all implants, local irritation and/or a reaction to the foreign body may occur.

At tissue level, reactions to the implant may include vaginal extrusion, erosion through the urethra or surrounding tissues, displacement of the device, fistula or inflammation. If any such reaction occurs, it may be necessary to completely remove the sling.

As with all foreign bodies, the polypropylene sling may aggravate a pre-existing infection

Over-correction may lead to temporary or permanent obstruction of the lower urinary tract and to retention of urine.

The known risks of surgery for the treatment of incontinence include hematoma, acute or chronic pain, scarification of the vagina, retraction or release of the mesh, infection, erosion, de novo urgency or voiding difficulties, dyspareunia, migration of the device, the total failure of the intervention leading to relapse. One or several repeated surgeries could also be necessary to treat those complications, as some complications are not always completely corrected.

### **USAGE PRECAUTIONS**

The LIFT® Kit device should be implanted by qualified surgeons only (knowledge of gynaecological and urological anatomy and surgery) who are extremely familiar with the device.

The LIFT® Kit implant, guide and ancillary devices are delivered sterile (ethylene oxide sterilization). Check that the packaging is intact before using (do not use if the labels and/or protective packaging are damaged). Do not use if the device is damaged.

The plastic sheath that covers the sling must be removed and must not be implanted.

Do not reuse or resterilize the implant, the guide and ancillary devices.

### **IMPORTANT: DO NOT REUSE - DO NOT RESTERILIZE**

As indicated on the product labelling, the implant, guide and ancillary devices are designed for single use. They should in no event be reused and/or resterilized (potential risks include but are not limited to: loss of product sterility, risk of infection, loss of effectiveness, relapse).

### **STORAGE**

To be stored in a dry place away from sunlight, at room temperature, in its original packaging.

### **IMPORTANT**

For more information about the use of this product, please contact your COUSIN BIOTECH representative or distributor.

### **EXPLANTATION AND DISPOSAL OF DEVICES**

Explantation and handling should be carried out in accordance with ISO 12891-1:2015 "Implants for surgery - Retrieval and analysis of surgical implants" Part 1: "Retrieval and Handling". Any explanted device must be returned for analysis as per the current protocol. This protocol is available from COUSIN BIOTECH on request. It is important to note that any implant that has not been cleaned and disinfected prior to dispatch must be placed in a sealed package. Explanted medical devices must be disposed of in accordance with local regulations governing the disposal of infectious hazardous waste. The disposal of non-implanted devices is not subject to specific recommendations. The second paragraph covers information requests or complaints.

### **INFORMATION REQUESTS AND COMPLAINTS**

In accordance with its quality policy, COUSIN BIOTECH is committed to producing and supplying high-quality medical devices. However, if health professionals (client, user, prescriber, etc.) wish to lodge a complaint or report dissatisfaction with a given product in terms of quality, safety or performance, they must inform COUSIN BIOTECH as soon as possible. In the event of implant failure or if the implant is implicated in serious adverse effects experienced by the patient, the health centre must follow the legal procedures in the country in question, and inform COUSIN BIOTECH without delay. The reference, batch number, reference contact details and a comprehensive description of the incident or complaint must be stated in all correspondence. Brochures, documentation and surgical techniques are available on request from COUSIN BIOTECH and its distributors.

### **IMPLANT CARD**

**Be sure to scan your implant card immediately upon receipt so that you can keep trackt of it in case of loss.**

### **Table of contents**

## **LIFT® Kit**

### **Bandelette de support sous-urétrale**

#### **DESCRIPTION**

Le LIFT® Kit se compose d'une bandelette, un guide et de 3 ancillaires (1 paire pour la technique trans-obturatrice et 1 ancillaire pour les voies supra et rétropubienne).

Ils sont à usage unique et livrés stériles.

La prothèse LIFT® est constituée d'une bandelette de polypropylène monofilament tricoté, conditionnée dans une gaine plastique. Elle est prolongée par des boucles autoserrantes permettant sa mise en place à ses extrémités.

Les ancillaires sont de formes différentes selon la voie choisie : 1 aiguille courbée pour les voies rétropubienne et suprapubienne, une paire d'aiguilles hélicoïdales pour les voies trans-obturatrices in-out et out-in.

L'extrémité des aiguilles des ancillaires est dotée d'une encoche permettant la fixation des boucles autoserrantes.

Un guide, à usage unique et livré stérile, est fourni avec l'implant pour sécuriser le passage de l'ancillaire en voie transobturatrice in-out.

Lors de la mise en place de la boucle autoserrante dans l'encoche, toujours s'assurer que le serrage a été effectué au maximum et que le fil est bien dans l'encoche prévue à cet effet afin que la prothèse ne se désolidarise pas de l'ancillaire lors du passage dans les tissus de la patiente. (Voir figure 1 ci-dessous)




Fig 1

#### **MATERIAUX**

- **Prothèse :** Polypropylène (monofilament tricoté)
- **Fils:** Polyéthylène téraphthalate + colorant biocompatible+ diméthyle siloxane
- **Ancillaire :** Aiguille en acier inoxydable, manche en polyoxyméthylène
- **Guide:** Polymère à cristaux liquides + colorant biocompatible.

**Origine ni humaine, ni animale - Non résorbable.**

#### **INDICATIONS**

La prothèse LIFT® est destinée à être utilisée comme bandelette de support sous-urétrale pour le traitement chirurgical de l'incontinence urinaire d'effort par voie vaginale chez la femme.

#### **PERFORMANCES**

Ces prothèses, biocompatibles et non biodégradables, provoquent une fibrose réactionnelle qui entraîne un renfort solide de la paroi. Ces prothèses ont l'avantage d'avoir une mise en place facile grâce à une forme adaptée, une très bonne souplesse, une intégration et une colonisation optimales et rapides.

#### **CONTRE INDICATIONS**

Ne pas implanter dans les cas suivants :

- Allergie à l'un des composants
- Chez la femme sous traitement anticoagulant.
- Infection du tractus urinaire
- Femme enceinte
- Enfant en croissance

Une patiente susceptible d'être enceinte doit être avertie qu'une grossesse risque d'annuler le bénéfice de l'intervention.

#### **EFFETS INDESIRABLES**

Comme tout dispositif médical implantable, cet implant est susceptible d'entraîner des effets secondaires indésirables tels que : Perforation ou lésion des vaisseaux sanguins, de la vessie, de l'urètre, des organes intrapéritonéaux, des nerfs.

Dans toutes les implantations, une irritation locale liée à l'intervention et/ou une réaction au corps étranger peut survenir.

Au niveau des tissus, les réactions à l'implant peuvent comprendre une extrusion, une érosion à travers l'urètre ou les tissus environnants, une migration du dispositif hors de l'emplacement désiré, la formation de fistule ou une inflammation. Si une telle réaction se produit, le retrait complet de la bandelette pourra s'avérer nécessaire.

Comme tout corps étranger, la bandelette en polypropylène peut activer une infection pré-existante.

La sur-correction peut entraîner une obstruction temporaire ou permanente du bas appareil urinaire et une rétention. Les risques connus d'une intervention chirurgicale pour le traitement de l'incontinence comprennent l'hématome, la douleur aiguë ou chronique, scarification du vagin, rétraction ou distension de la maille, l'infection, l'érosion, l'urgence de novo ou difficulté à uriner, la dyspareunie, la migration du dispositif, l'échec total de l'intervention entraînant une récidive. Une ou plusieurs reprises chirurgicales pourraient en outre s'imposer pour traiter ces complications, tandis qu'il se peut que certaines complications ne soient pas toujours corrigées complètement.

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Le dispositif LIFT® Kit doit être implanté **exclusivement** par un chirurgien qualifié (connaissance de l'anatomie et de la chirurgie gynécologique et urologique) connaissant parfaitement le dispositif, son utilisation prévue, les instruments et la technique chirurgicale.

L'implant, le guide et les ancillaires LIFT® Kit sont livrés stériles (stérilisation à l'oxyde d'éthylène) ; vérifier l'intégrité de l'emballage avant toute utilisation (ne pas utiliser en cas de détérioration des étiquettes d'inviolabilité et/ou de l'emballage de protection). Ne pas utiliser si le dispositif est endommagé.

La gaine en plastique qui recouvre la bandelette doit impérativement être retirée et ne pas être implantée.

Ne pas réutiliser et ne pas restériliser l'implant, le guide et les ancillaires.

#### **IMPORTANT: NE PAS REUTILISER - NE PAS RESTERILISER**

Conformément à l'étiquetage de ce produit, l'implant, le guide, les ancillaires sont à usage unique. Ils ne doivent en aucun cas être réutilisés et/ou restérilisés (risques potentiels incluent mais ne se limitent pas à: perte de stérilité du produit, risque d'infection, perte d'efficacité du produit, récidive).

### **PRECAUTIONS DE STOCKAGE**

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière du soleil et à température ambiante, dans son emballage d'origine.

### **IMPORTANT**

Pour toute information complémentaire relative à l'utilisation de ce produit, veuillez prendre contact avec votre représentant ou votre distributeur COUSIN BIOTECH.

### **EXPLANTATION ET ELIMINATION DES DISPOSITIFS**

Il convient d'observer les recommandations suivantes lors de l'explantation et de la manipulation des dispositifs : ISO 12891-1:2015 « Implants chirurgicaux. Retrait et analyse des implants chirurgicaux. » Partie 1 : « Retrait et manipulation ». Tout dispositif explanté doit être retourné en vue d'une analyse, conformément au protocole en vigueur. Ce protocole est disponible sur demande auprès de COUSIN BIOTECH. Il est important de noter que tout implant ne devant pas être nettoyé ni désinfecté avant expédition devra se trouver dans un emballage scellé. L'élimination du dispositif médical explanté doit être effectuée conformément aux normes du pays concerné en matière d'élimination des déchets infectieux. L'élimination d'un dispositif non implanté n'est soumise à aucune recommandation spécifique. Le deuxième paragraphe concerne les demandes d'informations et les réclamations.

### **DEMANDES D'INFORMATIONS ET RECLAMATIONS**

Conformément à sa politique qualité, COUSIN BIOTECH s'engage à tout mettre en œuvre pour produire et fournir un dispositif médical de qualité. Si, toutefois, un professionnel de santé (client, utilisateur, prescripteur...) avait une réclamation ou un motif d'insatisfaction concernant un produit, en termes de qualité, de sécurité ou de performances, il devrait en informer COUSIN BIOTECH dans les plus brefs délais. En cas de dysfonctionnement d'un implant ou si celui-ci a contribué à provoquer un effet indésirable grave pour le patient, le centre de soins devra suivre les procédures légales en vigueur dans son pays et en informer COUSIN BIOTECH dans les plus brefs délais. Pour toute correspondance, merci de préciser la référence, le numéro de lot, les coordonnées d'un référent, ainsi qu'une description exhaustive de l'incident ou de la réclamation. Les brochures, documentations et la technique opératoire sont disponibles sur simple demande auprès de COUSIN BIOTECH et de ses distributeurs.

### **CARTE D'IMPLANT**

**Veuillez à scanner ou prendre une photo de votre carte d'implant directement après réception de manière à garder une trace de la carte en cas de perte.**

### **Sommaire**

## **LIFT® Kit Unter-urethraler Trägerstreifen**

### **BESCHREIBUNG**

Das LIFT® Kit -Set besteht aus einem Band, 3 Hilfsvorrichtungen (1 Paar für Transobturator-Technik und 1 Hilfsvorrichtung für die retropubische und suprapubische Methode).

Sie sind für den Einmalgebrauch bestimmt und werden steril geliefert.

Die LIFT® Kit -Prothese besteht aus einem gewirktem Monofil-Polypropylenbändchen, das in einer Plastikhülle untergebracht ist.

Sie wird von selbstbefestigenden Schleifen verlängert, die ihr Anbringen an ihren Enden erlaubt.

Die Hilfsvorrichtungen haben unterschiedliche Formen, in Abhängigkeit von der gewählten Methode: 1 gebogene Nadel für die retropubische und suprapubische Methode, ein Paar spiralförmige Nadeln für die Transobturator-Technik in-out und out-in.

Das Ende der Nadeln der Hilfsinstrumente ist mit einer Kerbe versehen, die das Befestigen der selbstbefestigenden Schleifen erlaubt

Mit dem Implantat wird eine sterile Führung zur einmaligen Verwendung mitgeliefert, um den Durchgang des Ancillars bei der Transobturator-Technik in-out zu sichern.

Beim Anbringen der selbstbefestigenden Schleife in der Kerbe muss jeweils sichergestellt werden, dass maximal festgezogen wurde, und dass sich der Faden tatsächlich in der dazu vorgesehenen Kerbe befindet, damit sich die Prothese beim Durchgehen durch das Gewebe der Patientin nicht von dem Hilfselement trennt. (Siehe Abbildung 1 unten)




Abb. 1

### **MATERIALEN**

- **Prothese:** Gewirktes Monofil-Polypropylen
  - **Fäden:** Polyethylenterephthalat + biokompatibler Farbstoff + Dimethylsiloxan
  - **Hilfsvorrichtung:** Nadel aus rostfreiem Stahl, Griff aus Polyoxymethylen
  - **Führung:** Polymer mit Flüssigkristallen + biologisch verträglicher Farbstoff.
- Weder humanen noch tierischen Ursprungs - nicht resorbierbar.**

### **INDIKATIONEN**

Die LIFT® Prothese ist für die Verwendung als unter-urethrales Stützband bei der chirurgischen Behandlung der Belastungs-Harninkontinenz über einen vaginalen Zugang bei Frauen bestimmt.

### **ANWENDUNGSGBIETE**

Die Prothesen sind biokompatibel und nicht biologisch abbaubar. Sie rufen eine reaktive Fibrose hervor, die eine massive Verstärkung der Wand mit sich bringt. Die Prothesen haben den Vorteil, dass sie dank einer körperfertigten Form, ihrer hohen Flexibilität, ihrer schnellen und optimalen Integrierung und Kolonisation leicht einzubringen sind.

### **GEGENANZEIGEN**

Die Vorrichtung darf in den folgenden Fällen nicht implantiert werden:

- Allergie gegen einen der Bestandteile
- Bei Frauen, die Gerinnungshemmer einnehmen
- Infektion des Harntrakts
- Schwangerschaft
- Kinder im Wachstum

Patientinnen im gebärfähigen Alter sind darauf hinzuweisen, dass durch eine Schwangerschaft der Eingriff möglicherweise wirkungslos wird.

### **NEBENWIRKUNGEN**

Wie alle anderen medizinischen Implantate kann dieses Produkt ebenfalls Nebenwirkungen verursachen. Dazu zählen zum Beispiel: Perforation oder Beschädigung von Blutgefäßen, Blase, Harnröhre, Rektum, intraperitonealen Organen oder Nerven.

Wie bei allen Implantaten können lokale Irritationen und/oder eine Reaktion auf den Fremdkörper erfolgen.

Im Bereich des Gewebes können Reaktionen auf das Implantat aus vaginaler Extrusion, Erosion durch die Harnröhre oder umgebendes Gewebe, Verschiebung des Gewebes, Fisteln oder Entzündungen bestehen. Wenn eine solche Reaktion auftritt, kann es notwendig werden, die Schlinge vollständig zu entfernen.

Wie mit allen Fremdkörpern kann die Polypropylen-Schlinge eine bereits bestehende Infektion verschlimmern. Eine Überkorrektur kann zu einer zeitweiligen oder dauerhaften Verlegung des unteren Urinaltrakts und zur Rückhaltung von Urin führen.

Bekannte Risiken eines chirurgischen Eingriffs zur Behandlung von Inkontinenz sind Hämatom, akute oder chronische Schmerzen, Narbenbildung der Vagina, Rückzug oder Dehnung des Gewebes, Infektion, Erosion, de novo dringende oder ungültige Schwierigkeiten, Dyspareunie, Migrationsvorrichtung. Beim kompletten Misserfolg der Intervention muss diese wiederholt werden. Eine oder mehrere Revisionsoperationen müssen eventuell durchgeführt werden, um diese Komplikationen zu behandeln. Es kann aber auch sein, dass gewisse Komplikationen nicht mehr komplett behoben werden können.

### **VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH**

Die LIFT® Kit Vorrichtung darf ausschließlich von einem qualifizierten Chirurgen implantiert werden (Kenntnisse der Anatomie und der gynäkologischen und urologischen Chirurgie), der die Vorrichtung, ihre vorgesehene Verwendung, die Instrumente und die chirurgische Technik sehr gut kennt. Das LIFT® Kit Implantat, die Führung und die Hilfsvorrichtungen werden steril geliefert (mit Äthylenoxid sterilisiert), die Integrität der Verpackung vor jeder Benutzung prüfen (nicht bei Beschädigung der selbstklebenden Siegelkette und/oder der Schutzverpackung zu benutzen). Nicht benutzen, wenn die Vorrichtung beschädigt ist.

Die Kunststoffhülle, die das Band umhüllt, muss unbedingt entfernt werden und darf nicht implantiert werden.

Implantat, Führung und Hilfsvorrichtungen nicht wiederverwenden und nicht neu sterilisieren.

### **WICHTIG: NICHT WIEDERVERWENDEN UND NICHT NEU STERILISIEREN**

Gemäß der Kennzeichnung des Produkts sind das Implantat, die Führung und die Hilfsvorrichtungen zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Sie dürfen auf keinen Fall wiederverwendet und/oder neu sterilisiert werden (zu den möglichen Risiken zählen unter anderem: Verlust der Sterilität des Produkts, Infektionsgefahr, Verlust der Wirksamkeit des Produkts, Rezidiv)

### **VORSICHTSMABNAHMEN BEI DER LAGERUNG DER PROTHESE**

An einem trockenen Ort, vor Sonnenlicht geschützt, bei Raumtemperatur in der Originalverpackung lagern:

### **WICHTIG**

Für weitere Informationen zum Gebrauch dieses Produktes kontaktieren Sie bitte Ihren Vertreter oder COUSIN BIOTECH Vertriebshändler.

### **ENTNAHME UND ENTSORGUNG VON IMPLANTATEN**

Die Entnahme und die Handhabung sind gemäß der ISO-Norm 12891-1:2015 "Chirurgische Implantate - Entnahme und Analyse von chirurgischen Implantaten" - Teil 1: "Entnahme und Handhabung" erfolgen. Alle entnommenen Implantate müssen entsprechend des aktuellen Protokolls zur Analyse zurückgesendet werden. Das Protokoll ist auf Anfrage bei COUSIN BIOTECH erhältlich. Es ist wichtig, dass alle Implantate, die vor dem Versand nicht gereinigt und desinfiziert wurden, in einer versiegelten Verpackung enthalten sein müssen. Die Entsorgung von entnommenen medizinischen Implantaten muss gemäß den in dem Land der Entsorgung geltenden Vorschriften zur Entsorgung von infektiösen gefährlichen Abfällen zu erfolgen. Die Entsorgung von nicht-implantierten Implantaten unterliegt keinen speziellen Empfehlungen. Der zweite Abschnitt befasst sich mit den die Informationsanfragen oder mit Reklamationen.

### **ANFORDERUNG VON INFORMATIONEN UND REKLAMATIONEN**

Entsprechend seiner Qualitätssicherungspolitik verpflichtet sich COUSIN BIOTECH, alle erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, um qualitativ hochwertige Medizinprodukte herzustellen und zu liefern. Sollte das Gesundheitspersonal (Kunde, Nutzer, verschreibender Arzt...) jedoch aufgrund der Qualität, Sicherheit oder der Produktleistung Reklamationen vorbringen oder mit dem Produkt nicht zufrieden sein, müssen sie COUSIN BIOTECH unverzüglich darüber im Falle eines Defekts des Implantats oder im Falle von schwerwiegenden unerwünschten Nebenwirkungen für den Patienten die Gesundheitseinrichtung die entsprechenden, in ihrem Land geltenden rechtlichen Schritte befolgen und COUSIN BIOTECH unverzüglich informieren. Bitte geben Sie in Ihrer Korrespondenz die Referenz, die Chargennummer und die Koordinaten der Referenz an und fügen Sie eine verständliche Beschreibung des Vorfalls oder des Reklamationsgrunds bei. Broschüren, Dokumentationen und Operationstechniken sind auf Anfrage bei COUSIN BIOTECH und seinen Vertriebshändlern erhältlich.

### **IMPLANTATPASS**

**Scannen oder fotografieren Sie Ihren Implantatpass direkt nach dem Erhalt, damit Sie die Angaben im Falle eines Verlustes nachvollziehen können.**

### **Zusammenfassung**

## LIFT® Kit

### Striscia di sostegno sottouretrale

#### **DESCRIZIONE**

Il LIFT®Kit è composto da una striscia e da 3 strumenti (1 paio per la tecnica transotturatoria e 1 strumento per la via suprapubica retropubica).

Sono monouso e fornite sterili.

La protesi LIFT® è costituita da una striscia di polipropilene monofilamento di maglia , chiusa in una guaina plastica.

Viene prolungata da fibbie autoserranti che permette la collocazione alle sue estremità.

Gli strumenti sono in forme diverse, secondo la via scelta : 1 ago curvo per la via suprapubica retropubica , un paio di aghi elicoidali per le vie transotturatorie in-out e out-in.

L'estremità degli aghi degli ancillari è munita di una tacca che consente di fissarla con fibbie autoserranti

Una guida, monouso e sterile viene fornita con l'impianto per guidare il passaggio dello strumento in via transotturatoria in-out.

Al momento della collocazione della fibbia autoserrante nella tacca, assicurarsi sempre che lo stringimento sia stato effettuato al massimo e che il filo si trovi nella apposita tacca affinché la protesi non si stacchi dall'ancillare al momento del passaggio nei tessuti della paziente (vedi figura 1 qui sotto).




Fig 1

#### **MATERIALI**

- **Protesi :** Polipropilene (monofilamento lavorato a maglia)
- **Fili:** polietilene tereftalato + colorante biocompatibile + dimetil siloxano
- **Strumenti :** Ago in acciaio inossidabile, manico in poliossimetilene
- **Guida:** Polimero a cristalli liquidi + colorante biocompatibile.

**Origine non umana né animale, non riassorbibile.**

#### **INDICAZIONI**

La protesi LIFT® è destinata ad essere impiegata come benda di supporto uretrale per il trattamento chirurgico dell'incontinenza urinaria da sforzo per via vaginale nella donna.

#### **PRESTAZIONI**

Queste protesi, biocompatibili e non biodegradabili, portano alla creazione di una fibrosi reattiva che rafforza la parete. Queste protesi hanno il vantaggio di avere un posizionamento facile grazie ad una forma adattata, un'ottima elasticità, un'integrazione e una colonizzazione ottimale e rapida.

#### **CONTROINDICAZIONI**

Non impiantare nei seguenti casi :

- Allergia ad uno dei componenti
- Su donne sottoposte a trattamenti anticoagulanti
- Infezione del tratto urinario
- Donna incinta
- Bambina in fase di sviluppo.

Una paziente con probabile gravidanza deve essere avvertita del fatto che la gravidanza rischia di vanificare il beneficio apportato dall'intervento.

#### **EFFETTI SECONDARI**

Come in tutti gli impianti medici, questo prodotto può avere effetti secondari, quali:

perforazione o danno ai vasi sanguigni, alla vescica, uretra, al retto, agli organi intraperitoneali o ai nervi.

Come per tutti gli impianti, si può verificare irritazione locale e/o reazione al corpo esterno.

A livello tissutale, le reazioni all'impianto possono comprendere estrusione vaginale, erosione attraverso l'uretra e i tessuti circostanti, spostamento del dispositivo, fistola o infiammazione. Se si verifica tale reazione, può essere necessario rimuovere completamente lo sling.

Come per tutti i corpi esterni, lo sling in polipropilene può aggravare un'infezione preesistente.

La sovraccorrezione può condurre a ostruzione temporanea o permanente del tratto urinario inferiore e a ritenzione urinaria.

I rischi noti di un intervento chirurgico per il trattamento dell'incontinenza comprendono: ematoma, dolore acuto o cronico, scarificazione della vagina, retrazione o distensione della rete, infezione, erosione, de novo urgenza o annullamento delle difficoltà, dispareunia, migrazione del dispositivo, totale fallimento dell'intervento che comporti recidiva. Uno o diversi reinterventi potrebbero inoltre essere necessari per curare tali complicanze, mentre è possibile che esse non possano sempre essere corrette completamente.

### **PRECAUZIONI D'USO**

Il dispositivo LIFT®Kit deve essere impiantato **solo ed esclusivamente** da un chirurgo qualificato (con conoscenze anatomiche e di chirurgia ginecologica ed urologica) che conosce perfettamente il dispositivo, il suo utilizzo previsto, gli strumenti e la tecnica chirurgica. L'impianto, il guida e lo strumentario LIFT®Kit sono venduti sterili (sterilizzazione con ossido di etilene), verificare l'integrità della confezione (non utilizzare in caso di deterioramento delle etichette e/o della confezione protettiva). Non utilizzare il dispositivo se danneggiato.

La guaina in plastica che ricopre la striscia deve essere staccata e non impiantata.

Non riutilizzare e non risterilizzare l'impianto, il guida e lo strumentario.

### **IMPORTANTE: NON RIUTILIZZARE - NON RISTERILIZZARE**

Conformemente all'etichettatura di questo prodotto, la protesi, la guida e lo strumento sono monouso. In nessun caso devono essere riutilizzati e/o risterilizzati. I potenziali rischi includono, ma non si limitano: perdita di sterilità del prodotto, rischio di infezione, perdita di efficacia del prodotto, recidiva.

### **ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Conservare nella sua confezione originale in luogo asciutto al riparo dalla luce solare ed a temperatura ambiente.

### **IMPORTANTE**

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa all'utilizzazione di questo prodotto, contattare il vostro rappresentante o il vostro distributore COUSIN BIOTECH.

### **RECUPERO E SMALTIMENTO DEI DISPOSITIVI**

L'espianto e il trattamento devono avvenire secondo le raccomandazioni della norma ISO 12891-1:2015 "Impianti per chirurgia - Recupero e analisi di impianti chirurgici" Parte 1: "Recupero e trattamento". Qualsiasi dispositivo espantato deve essere restituito per essere analizzato in base all'attuale protocollo. Questo protocollo è disponibile su richiesta presso COUSIN BIOTECH. È importante tener presente che qualsiasi impianto che non sia stato pulito e disinfectato prima della spedizione deve essere imballato in una confezione sigillata. L'eliminazione del dispositivo medico espantato deve essere effettuata secondo le norme in uso nel paese per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi infettivi. L'eliminazione di un dispositivo non impiantato non è soggetta a raccomandazioni specifiche. Il secondo paragrafo si applica ai casi di richiesta di informazioni o reclami.

### **RICHIESTA DI INFORMAZIONI E RECLAMI**

Conformemente alla sua politica sulla qualità, cousin biotech si impegna a fare tutto il possibile per produrre e fornire dispositivi medici di ottima qualità. Tuttavia, se un professionista sanitario (cliente, utente, prescrittore...) ha un reclamo o un motivo di insoddisfazione in relazione a un prodotto e alla sua qualità, sicurezza o prestazione, deve informare tempestivamente COUSIN BIOTECH. In caso di malfunzionamento di un impianto o se questo ha provocato nel paziente gravi effetti avversi, la struttura sanitaria deve seguire le procedure legali vigenti nel suo paese e informare immediatamente COUSIN BIOTECH. Per qualsiasi comunicazione si prega di specificare il riferimento, il numero di lotto, gli estremi di un referente e una descrizione particolareggiata dell'incidente o del reclamo. Gli opuscoli, la documentazione e la tecnica chirurgica sono disponibili su richiesta presso COUSIN BIOTECH e i suoi distributori.

### **SCHEDA D'IMPIANTO**

**Effettuare la scansione o scattare una foto della scheda d'impianto direttamente al suo ricevimento per tenere traccia di essa in caso di smarrimento.**

### **Sommario**

## **LIFT®Kit**

### **Banda de suspensión suburetral**

**DESCRIPCIÓN**

El LIFT®Kit consta de una banda y de 3 anciliares (1 par para la técnica transobturatriz y 1 ancilar para la vía suprapública y retropública). De uso único y entrega estéril.

La prótesis LIFT® está constituida por una banda de polipropileno monofilamento tricotada, envasada en una vaina de plástico. Prolongación mediante bucles de apriete automático en sus extremos que permiten su colocación.

Los anciliares tienen formas diferentes según la vía elegida: 1 aguja curva para las vías suprapública y retropública, un par de agujas helicoidales para las vías transobturadoras in-out y out-in

El extremo de las agujas de los anciliares presenta una muesca que permite la fijación de los bucles de apriete automático.

Se suministra un guía, de uso único y estéril, con implante para asegurar el paso del ancilar por vía transobturadora in-out.

Durante la colocación del bucle de apriete automático en la muesca, asegurarse siempre de que la presión se ha efectuado al máximo y de que el hilo está dentro de la muesca prevista a este efecto con el fin de que la prótesis no se desuna del auxiliar durante el paso al tejido de la paciente. (Ver la figura 1 abajo)



Fig 1

**MATERIALES**

- **Prótesis :** Polipropileno (monofilamento tricotado)
- **Hilo:** polietileno tereftalato + colorante biocompatible+ polidimetilsiloxano
- **Ancilar :** Aguja de acero inoxidable, manguito de polioximetileno
- **Guía:** Polímero de cristal líquido + colorante biocompatible.

**Origen ni humano ni animal - No reabsorbible****INDICACIONES**

La prótesis LIFT® está destinada a ser utilizada como banda de soporte uretral para el tratamiento quirúrgico de incontinencia urinaria de esfuerzo por vía vaginal en la mujer.

**APLICACIONES**

Estas prótesis, biocompatibles y no biodegradables, provocan una fibrosidad reactiva que permite un refuerzo sólido de la pared.

Estas prótesis tienen la ventaja de colocarse fácilmente gracias a una forma adaptada, una gran flexibilidad, una integración y una colonización óptima y rápida.

**CONTRAINDICACIONES**

No implantar en los siguientes casos:

- alergia a uno de los componentes
- en mujeres bajo tratamiento con anticoagulantes
- infección del tracto urinario
- mujer embarazada
- niño en crecimiento

Una paciente que pueda estar embarazada deberá ser advertida de que un embarazo corre el riesgo de anular el beneficio de la intervención.

**EFFECTOS SECUNDARIOS**

Al igual que todos los implantes médicos, este producto puede provocar efectos secundarios, como:

Perforación o daños en los vasos sanguíneos, la vejiga, uretral, el recto, los órganos intraperitoneales o los nervios.

Al igual que ocurre con todos los implantes, se podría producir irritación local y/o reacción al cuerpo extraño.

A nivel tisular, entre las reacciones al implante se pueden incluir la extrusión vaginal, las erosiones a través de la uretra o los tejidos adyacentes, el desplazamiento del dispositivo, fistulas o inflamación. En caso de producirse alguna de estas reacciones, es posible que sea necesario retirar completamente la eslinga.

Al igual que ocurre con todos los cuerpos extraños, la eslinga de polipropileno podría agravar la infección previamente existente.

La sobre corrección podría provocar la obstrucción temporal o permanente del tracto urinario inferior o la retención de orina.

Los riesgos conocidos de una intervención quirúrgica para el tratamiento de la incontinencia comprenden hematoma, el dolor agudo o crónico, escarificación de la vagina, retractación o distensión de la malla, infección, erosión, urgencia de novo o dificultades de anulación, dispareunia, migración del dispositivo o fallo de la intervención que comporta una recaída. Podrían ser necesarias una o más intervenciones quirúrgicas para tratar estas complicaciones mientras que puede que algunas complicaciones no se acaben de corregir del todo.

### **PRECAUCIONES DE USO**

El dispositivo LIFT®Kit deberá ser implantado exclusivamente por un cirujano cualificado (conocimiento de la anatomía y de la cirugía ginecológica y urológica) que conozca perfectamente el dispositivo, su utilización prevista, los instrumentos y la técnica quirúrgica. El implante, el guia y los anciliares LIFT®Kit se entregan estériles (esterilización con óxido de etileno), compruebe el buen estado del envase (no utilice el producto en caso de deterioro de las etiquetas o del envase de protección). No utilice el dispositivo si está dañado. La vaina de plástico que recubre la banda debe obligatoriamente ser retirada y no implantada.

No reutilizar y no volver a esterilizar el implante, el guia y los anciliares.

### **IMPORTANTE: NO VOLVER A UTILIZAR NI ESTERILIZAR**

Conforme al etiquetado del producto, el implante, la guía y los anciliares son de uso único. En ningún caso deben volver a utilizarse y/o esterilizarse (los riesgos potenciales incluyen, sin limitarse a ello: pérdida de esterilidad del producto, riesgo de infección, pérdida de eficacia del producto, recaída).

### **PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN**

Conservarse en un sitio seco, protegido de la luz solar y a temperatura ambiente en su envase original.

### **IMPORTANTE**

Para cualquier información adicional en relación con la utilización de este producto, póngase en contacto con el representante de su zona o con el distribuidor COUSIN BIOTECH correspondiente.

### **RECUPERACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DISPOSITIVOS**

La explantación y la manipulación se deben hacer siguiendo las recomendaciones de la ISO 12891-1:2015 «Implantes de cirugía - Recuperación y análisis de implantes quirúrgicos» Parte 1: «Recuperación y manipulación». Cualquier dispositivo explantado debe ser devuelto para su análisis siguiendo el protocolo actual. Este protocolo está disponible previa petición a COUSIN BIOTECH. Es importante que tenga en cuenta que cualquier implante que no se deba limpiar y desinfectar antes de su expedición debe almacenarse en un paquete sellado. La eliminación de dispositivos médicos explantados se debe realizar de conformidad con la normativa del país sobre eliminación de residuos peligrosos infecciosos. La eliminación de un dispositivo no implantado no está sujeta a recomendaciones específicas. El segundo párrafo trata sobre solicitudes de información o quejas.

### **PETICIÓN DE INFORMACIÓN Y QUEJAS**

De conformidad con su política de calidad, COUSIN BIOTECH se compromete a hacer todo lo posible para fabricar y suministrar dispositivos médicos de alta calidad. Sin embargo, si un profesional de la salud (cliente, usuario, médico prescriptor...) tuviera una queja o un motivo de insatisfacción con un producto debido a su calidad, seguridad o rendimiento, deberá informar a COUSIN BIOTECH lo antes posible. En caso de fallo del implante o si provoca efectos adversos graves al paciente, el centro de salud debe seguir los procedimientos legales de su país e informar a COUSIN BIOTECH a la mayor brevedad. En cualquier correspondencia que nos remita, le rogamos que indique la referencia, el número de lote, las coordenadas de referencia y una descripción exhaustiva del incidente o queja. Puede solicitar folletos, documentación y procedimientos quirúrgicos a COUSIN BIOTECH o a sus distribuidores.

### **FICHA DE IMPLANTE**

**Escaneé o haga una fotografía de su ficha de implante inmediatamente después de recibirla, para conservar una copia de la ficha en caso de pérdida.**

### **Resumen**

## Nota de instruções

### **LIFT® Kit** **Tela de suporte suburetral**

#### **DESCRICAÇÃO**

O LIFT® Kit é composto por uma tela e 3 acessórios utilizados para a implantação do produto não reutilizável, que são fornecidos estéreis (1 par para a técnica transobturadora e 1 acessório para as vias suprapúbica e retropública). São de utilização única e fornecidos esterilizados.

A tela LIFT® Kit é constituída por uma tela de polipropileno monofilamento entrelaçado, alojada em uma bainha de plástico.

É prolongada por anéis de aperto automático em suas extremidades que permitem a sua colocação.

Os acessórios são de formas diferentes, dependendo da via escolhida: 1 agulha curva para as vias suprapúbica (out-in) e retropública (in-out), um par de agulhas helicoidais para as vias transobturadoras in-out e out-in.

A extremidade das agulhas dos acessórios está munida de um entalhe que permite a fixação com anéis de aperto automático.

Uma guia não reutilizável é fornecida estéril com a tela, para assegurar a passagem do acessório na via transobturadora in-out.

No momento da colocação do anel de aperto automático no entalhe, verificar sempre que o aperto foi feito ao máximo e que o fio está corretamente no entalhe previsto para este fim, evitando que a tela fique solta do apoio durante a passagem pelos tecidos da paciente. (Ver figura 1 abaixo)




Fig 1

#### **MATERIAL**

- **Tela:** polipropileno (monofilamento entrelaçado)
  - **Fios:** polietileno tereftalato + colorante biocompatível+ dimetilpolisiloxano
  - **Acessório:** Agulha de aço inoxidável, cabo de polioximetileno
  - **Guia:** Polímero de cristais líquidos + corante biocompatível
- De origem não humana e não animal – Não reabsorvível.**

#### **INDICAÇÕES**

A tela LIFT® destina-se a ser usada como tela de suporte uretral para o tratamento cirúrgico da incontinência urinária de esforço por via vaginal na mulher.

#### **DESEMPENHO**

Estas telas, biocompatíveis e não biodegradáveis provocam uma fibrose reacional que ocasiona um reforço sólido da parede.

Estas telas apresentam a vantagem de uma fácil colocação, em virtude da sua forma adaptada, da sua excelente flexibilidade e da sua ótima e rápida integração e colonização.

#### **CONTRA-INDICAÇÕES**

Não implantar nos seguintes casos:

- Alergia a um dos componentes
- Em mulheres sob tratamento anticoagulante
- Infecção do aparelho urinário
- Gravidez
- Criança em crescimento

Uma paciente que possa estar grávida deve ser informada de que a gravidez poderá anular os benefícios da intervenção.

#### **EFEITOS SECUNDÁRIOS**

À semelhança de todos os implantes médicos, este produto poderá provocar efeitos secundários, tais como:

Perfuração ou danos a vasos sanguíneos, bexiga, uretra, recto, órgãos ou nervos intraperitoneais.

Tal como com todos os implantes, poderá ocorrer irritação local e/ou reação ao corpo estranho.

Ao nível dos tecidos, as reações ao implante poderá incluir extrusão vaginal, erosão uretral ou de tecidos circundantes, migração do dispositivo, fístula ou inflamação. Se ocorrer alguma destas reações, poderá ser necessário retirar completamente a funda.

Tal como com todos os corpos estranhos, a funda em polipropileno poderá agravar infecção pré-existente.

A sobrecorrção poderá levar a obstrução temporária ou permanente do trato urinário inferior e à retenção urinária.

Os riscos conhecidos de uma intervenção cirúrgica para o tratamento de incontinência incluem hematoma, a dor aguda ou crónica, escarificação da vagina, retração ou distensão da malha, infecção, erosão, de novo urgência ou dificuldades de esvaziamento, dispareunia, a migração do dispositivo, a falha total da intervenção conduzindo a recidiva. Poderá dar-se a necessidade de uma ou mais cirurgias posteriores para o tratamento destas complicações, tratando-se de ocorrências não completamente corrigidas.

### **PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

O dispositivo LIFT®Kit deve ser implantado exclusivamente por um cirurgião qualificado (com conhecimentos anatômicos e de cirurgia ginecológica e urológica), que conheça perfeitamente o dispositivo, a utilização a que este se destina, bem como os instrumentos e a técnica cirúrgica.

A tela, o guia e os acessórios LIFT®Kit são fornecidos estéreis (esterilização com óxido de etileno); confirmar a integridade da embalagem antes de cada utilização (não usar em caso de deterioração das etiquetas de inviolabilidade e/ou da embalagem protetora). Não usar se o dispositivo estiver danificado.

A bainha de plástico que reveste a tela deve obrigatoriamente ser retirada e não deve ser implantada.

Não reutilize, nem reesterilize a tela ou guia ou os acessórios.

### **IMPORTANTE: NÃO REUTILIZAR – NÃO REESTERILIZAR**

Em conformidade com a rotulagem deste produto, tanto a tela como os acessórios só devem ser utilizados uma única vez. Não devem, em caso algum, ser reutilizados e/ou reesterilizados (os riscos potenciais incluem, entre outros: perda de esterilidade do produto, risco de infecção, perda de eficácia do produto, recidiva).

### **PRECAUÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Conservar em lugar seco, ao abrigo da luz solar e à temperatura ambiente, na embalagem original.

### **IMPORTANTE**

Para obter todas as informações complementares relativas à utilização deste produto, entrar em contato com o representante ou o distribuidor COUSIN BIOTECH.

### **EXPLANTAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE DISPOSITIVOS**

A explantação e o manuseamento devem ser realizadas de acordo com as recomendações da ISO 12891-1:2015 «implantes para cirurgia - recuperação e análise de implantes cirúrgicos» parte 1: «recuperação e manuseamento». Qualquer dispositivo explantado deve ser devolvido, para análise, seguindo o protocolo atual. Este protocolo está disponível mediante pedido à COUSIN BIOTECH. É importante ter em atenção que qualquer implante que não tenha sido limpo e desinfetado antes da expedição deve estar dentro de uma embalagem selada. A eliminação de um dispositivo médico explantado deve ser realizada de acordo com as normas nacionais de eliminação de resíduos perigosos infeciosos. A eliminação de um dispositivo não implantado não está sujeita a recomendações específicas. O segundo parágrafo serve para o caso de pedido de informações ou reclamações.

### **PEDIDO DE INFORMAÇÕES E RECLAMAÇÕES**

De acordo com a sua política de qualidade, a COUSIN BIOTECH compromete-se em enviar todos os esforços para criar e fornecer um dispositivo médico de alta qualidade. Contudo, se um profissional de saúde (cliente, utilizador, médico...) tiver uma reclamação ou motivo de insatisfação com um produto em termos de qualidade, segurança ou desempenho, deve informar a COUSIN BIOTECH o mais rapidamente possível. Em caso de falha de um implante ou se isso contribuir para provocar efeitos adversos graves no paciente, o centro de saúde deve seguir os procedimentos legais do seu país e informar a COUSIN BIOTECH com a maior brevidade possível. Para toda a correspondência, é favor especificar a referência, número de lote, as coordenadas de uma referência e uma descrição detalhada do incidente ou reclamação. Brochuras, documentação e técnica cirúrgica estão disponíveis mediante pedido à COUSIN BIOTECH e aos seus distribuidores.

### **CARTÃO DE IMPLANTE**

**Certifique-se de que digitaliza ou tira uma fotografia do seu cartão de implante diretamente junto da receção de forma a conservar um rasto do cartão em caso de extravio.**

### **Resumo**

## **LIFT®Kit**

### Υποουρηθρικές ταινίες στήριξης

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το LIFT®Kit περιλαμβάνει μία ταινία ανάτασης και 3 βοηθητικές συσκευές (1 ζευγάρι για την τεχνική του θυροειδούς τρήματος και 1 για την οπισθοβικός και υπερηβική προσέγγιση)

Είναι μίας χρήσης και παραδίδονται αποστειρωμένα.

Η πρόθεση LIFT® αποτελείται από μια ταινία από πλεκτό, μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, συσκευασμένη σε πλαστική θήκη.

Διαθέτει στις άκρες της βρόχους που σφρίγγουν για την τοποθέτησή της.

Οι βοηθητικές συσκευές έχουν διαφορετικά σχήματα, ανάλογα με την επιλεγμένη προσέγγιση: 1 κυρτή βελόνα για την οπισθοβική και διά του θυροειδούς τρήματος προσέγγιση, ένα ζευγάρι ελικοειδών βελόνων για τις εκ των έσω και εκ των έξω δια του θυροειδούς τρήματος προσέγγισεις.

Το άκρο των βοηθητικών βελονών διαθέτει μια υποδοχή για τη στερέωση των βρόχων.

Ένας αποστειρωμένος οδηγός μίας χρήσης παρέχεται με το εμφύτευμα, για να ασφαλίσει την πρόσβαση της βοηθητικής συσκευής κατά τη διάρκεια της εκ των έσω δια του θυροειδούς τρήματος προσέγγισης.

Κατά την τοποθέτηση του βρόχου στην υποδοχή, βεβαιωθείτε ότι είναι όσο το δυνατόν πιο σφιχτός και ότι το νήμα είναι στην κατάλληλη υποδοχή, έτσι ώστε η πρόθεση να μην σχίζεται από τη βοηθητική βελόνα κατά τη διέλευση στους ιστούς του ασθενούς. (Βλ. εικόνα 1 παρακάτω)



Εικόνα 1

**ΥΛΙΚΑ**

- **Πρόθεση:** πολυπροπυλένιο (πλεκτό μονόκλωνο)
  - **Νήμα:** Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο + βιοσυμβατή χρωστική ουσία + διμεθυλοσιλοξάνη
  - **Βοηθητική συσκευή:** Βελόνα από ανοξείδωτο χάλυβα, περίβλημα από πολυοξυμεθυλένιο
  - **Οδηγός:** Πολυμερές υγρού ιρυστάλλου + βιοσυμβατή χρωστική ουσία.
- Νήμα μη ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης - Μη απορροφήσιμο.**

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Η πρόθεση LIFT® έχει σχεδιαστεί για χρήση ως υποουρηθρική ταινία ανάτασης για τη χειρουργική θεραπεία με κολπική προσέγγιση στις γυναίκες.

**ΑΠΟΔΟΣΗ**

Αυτές οι βιοσυμβατές, μη βιοαποικοδομήσιμες προθέσεις προκαλούν αντιδραστική ίνωση που παράγει πρόσθετη στήριξη της ουρήθρας.

Αυτές οι προθέσεις είναι εύκολες στην εισαγωγή τους λόγω του ειδικά σχεδιασμένου σχήματός τους, της εξαιρετικής ευκαμψίας τους, του βέλτιστου και γρήγορου αποικισμού και της ενσωμάτωσής τους.

**ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Μην χρησιμοποιείτε το εμφύτευμα στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο από τα υλικά του
- Σε περίπτωση που ακολουθείται αντιπτκτική αγωγή
- Σε περίπτωση ουρολοίμωξης
- Σε εγκύους
- Σε παιδιά σε ανάπτυξη

Κάθε ασθενής με πιθανότητα εγκυμοσύνης θα πρέπει να προειδοποιείται ότι η εγκυμοσύνη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διαδικασία.

**ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Όπως συμβαίνει με όλα τα ιατρικά εμφυτεύματα, το προϊόν αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρενέργειες, όπως:

Διάτρηση ή βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία, στην ουροδόχο κύστη, στο ορθό, στα ενδοπεριτοναϊκά όργανα ή στα νεύρα.

Όπως συμβαίνει με όλα τα εμφυτεύματα, μπορεί να παρουσιαστεί τοπικός ερεθισμός ή/και αντιδραση στο ξένο σώμα.

Σε επίπεδο ιστών, οι αντιδράσεις στο εμφύτευμα μπορεί να περιλαμβάνουν κολπική εξώθηση, διάβρωση της ουρήθρας ή των περιβάλλοντων ιστών, μετατόπιση της συσκευής, σχηματισμό συριγγίου ή φλεγμονή. Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε από αυτές τις αντιδράσεις, μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσετε τελείως την ταινία.

Όπως συμβαίνει με όλα τα ξένα σώματα, η ταινία πολυπροπυλενίου μπορεί να επιδεινώσει μια προϋπάρχουσα μόλυνση ή δυσπαρευνία.

Η υπερβολική διόρθωση μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη απόφραξη του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος και σε κατακράτηση ούρων.

Οι γνωστοί κίνδυνοι των χειρουργικών επεμβάσεων για την θεραπεία της ακράτειας περιλαμβάνουν οξύ και χρόνιο πόνο, κνησμό του κόλπου, συστολή πλέγματος στήριξης, λοίμωξη, διάβρωση, συχνούσυρία, δυσπαρευνία, μετατόπιση συσκευής, συνολική αποτυχία της επέμβασης που οδηγεί σε υποτροπή. Μία ή πολλές επαναλαμβανόμενες χειρουργικές επεμβάσεις ενδεχομένως να βοηθούσαν στην αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων, καθώς κάποιες από αυτές αντιμετωπίζονται πλήρως.

### **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εμφύτευση της συσκευής LIFT® Kit θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους χειρουργούς (με γνώση γυναικολογίας, ανατομίας του ουροποιητικού συστήματος και των αντίστοιχων χειρουργικών επεμβάσεων), οι οποίοι είναι εξαιρετικά εξοικειωμένοι με τη συσκευή.

Το εμφύτευμα LIFT® Kit, ο οδηγός και οι βοηθητικές συσκευές παραδίδονται αποστειρωμένες (αποστείρωση με οξείδιο του αιθυλενίου). Ελέγχετε αν η συσκευασία είναι άθικτη πριν από τη χρήση (να μη χρησιμοποιείται αν οι ετικέτες ή/και η προστατευτική συσκευασία έχουν υποστεί φθορά). Να μην χρησιμοποιείται, εάν η συσκευή έχει υποστεί κάποια βλάβη.

Η πλαστική θήκη που καλύπτει την ταινία πρέπει να αφαιρείται και να μην εμφυτεύεται.

Μην επαναχρησιμοποιείτε και μην αποστειρώνετε εκ νέου το εμφύτευμα, τον οδηγό και τις βοηθητικές συσκευές.

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ**

Όπως επισημαίνεται στην ετικέτα του προϊόντος, το εμφύτευμα, ο οδηγός και οι βοηθητικές συσκευές είναι σχεδιασμένα για μία μόνο χρήση. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επαναχρησιμοποιηθούν ή/και να αποστειρωθούν εκ νέου (στους πιθανούς κινδύνους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: απώλεια στειρότητας του προϊόντος, κίνδυνος μόλυνσης, απώλεια αποτελεσματικότητας, υποτροπή).

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Διατηρήστε το προϊόν σε στεγνό χώρο, μέσα στην αρχική του συσκευασία, προφυλαγμένο από το φως δύο ήλιος και σε θερμοκρασία δωματίου.

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο ή τον διανομέα της COUSIN BIOTECH.

### **ΕΚΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

Η εκφύτευση και ο χειρισμός θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις του προτύπου ISO 12891-1:2015 «Εμφυτεύματα χειρουργικής - Ανάκτηση και ανάλυση χειρουργικών εμφυτευμάτων» Μέρος 1: «Ανάκτηση και Χειρισμός». Κάθε συσκευή που εκφυτεύεται θα πρέπει να επιστρέφεται για ανάλυση σύμφωνα με το τρέχον πρωτόκολλο. Αυτό το πρωτόκολλο είναι διαθέσιμο μετά από αίτημα στην COUSIN BIOTECH. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε εμφύτευμα που δεν έχει καθαριστεί και απολυμανθεί πριν από την αποστολή θα πρέπει να τοποθετείται σε σφραγισμένη συσκευασία. Η καταστροφή μιας εκφυτευμένης ιατρικής συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα της εκάστοτε χώρας για την απόρριψη επικίνδυνων λοιμωδών αποβλήτων. Η καταστροφή συσκευής που δεν έχει εμφυτευτεί δεν υπόκειται σε συγκεκριμένες συστάσεις. Η δεύτερη παράγραφος ισχύει σε περίπτωση αιτήματος για πληροφορίες ή παραπόνων.

### **ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

Σύμφωνα με τη δική της πολιτική ποιότητας, η COUSIN BIOTECH δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παράγει και να προμηθεύει ιατρικές συσκευές υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, εάν κάποιος επαγγελματίας του κλάδου υγείας (πελάτης, χρήστης, παραπέμπων ιατρός, κλπ.) προβάλλει κάποια απαίτηση ή δεν είναι ικανοποιημένος με το προϊόν ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια ή τις επιδόσεις, θα πρέπει να ενημερώσει την COUSIN BIOTECH το συντομότερο δυνατόν. Σε περίπτωση βλάβης σε κάποιο εμφύτευμα ή συμβολής στην πρόκληση σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων στον ασθενή, το κέντρο υγείας θα πρέπει να ακολουθήσει τις νομικές διαδικασίες που ισχύουν στη χώρα του, και να ενημερώσει την COUSIN BIOTECH το συντομότερο. Σε κάθε επικοινωνία, παρακαλείσθε να προσδιορίζετε τον αριθμό αναφοράς, τον αριθμό παρτίδας, τα στοιχεία της σχιτικής παραπομπής και να δίνετε συνοπτική περιγραφή του συμβάντος ή της απαίτησης. Τα φυλλάδια, η τεκμηρίωση και η χειρουργική τεχνική είναι διαθέσιμα μετά από αίτημα στην COUSIN BIOTECH και τους διανομείς της.

### **ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ**

Σαρώστε ή φωτογραφήστε την καρτέλα του εμφυτεύματος μόλις την λάβετε έτσι ώστε να έχετε τα στοιχεία της καρτέλας σε περίπτωση απώλειας.

[Περίληψη](#)

**Suburethralis támasztó szalag****LEÍRÁS**

A LIFT® Kit készlet egy szalagot és 3 felvezető eszközt tartalmaz (1 pár transzobturátor technikához, 1 retropubikus és szuprapubikus megközelítéshez).

Az eszközök egyszer használatosak, steril állapotban kerülnek kiszállításra.

A LIFT® protézis egy polipropilén, monofil, csomázott szalag, műanyag tokba csomagolva.


A felhelyezést segítendő öncsomatózó hurkokkal hosszabbított.

A felvezető eszközök különböző formájúak a választott technikának megfelelően: 1 hajlított tű retropubikus vagy szuprapubikus megközelítéshez, egy pár spirális tű in-out (be-ki) vagy out in (ki-be) transzobturátor technikához.

A felvezető eszközök végén vágat található az öncsomatózó hurkoknak.

A implantátumhoz egyszer használatos, steril vezetőt biztosítunk, hogy a felvezető eszközök használatát segítse in-out transzobtátoros megoldás esetén.

Az öncsomatózó hurok használata során minden győződjünk meg róla, hogy az a lehető legszorosabb legyen, valamint hogy az arra szolgáló vájatban legyen, hogy ne tudjon leválni az eszkösről, miközben áthatol a szöveten. (Lásd 1. ábra)



1. ábra

**ALAPANYAG**

- **Protézis:** polipropilén (csomázott, monofil)
- **Hurok:** Polietilén tereftalát + biokompatibilis festék + dimetil sziloxán
- **Felvezető eszköz:** Rozsdamentes acél tű, polioximetilén nyél.
- **Vezető:** Folyadékkristályos polímer + biokompatibilis festék.

**Nem emberi vagy állati eredetű - Nem felszívódó**

**FELHASZNÁLÁSA:**

A LIFT® protézis vaginális sebészeti felhasználásra készült suburetralis támasztó szalag

**HATÁSA**

A biokompatibilis, biológiai úton nem lebomló protézis elősegíti a reaktív fibrózist, ami további urethrális támasztást biztosít.

A különleges kialakítású protézist könnyű felhelyezni, flexibilis és ideális, gyors kolonizációt és integrációt biztosít.

**ELLENJAVALLATOK**

Ne használja a következő esetekben:

- Bármely összetevővel szembeni allergia
- Antikoaugális terápia
- Húgyúti fertőzés
- Terhesség
- Fejlődésben lévő csontozatú gyermek

Amennyiben elkövethető, hogy a páciens még terhes lehet a jövőben, fel kell hívni rá a figyelmét, hogy a terhességgel elveszítheti a beavatkozás nyújtotta előnyökét.

**MELLÉKHATÁSOK**

Mint bármilyen orvosi implantátumnál, itt is felléphetnek mellékhatások:

Sérülés vagy perforáció a következőknél: véredények, hólyagok, rektum, intraperitoneális szervek és idegek.

Mint bármilyen implantátumnál, itt is felléphet helyi irritáció és/vagy idegen test reakció.

Szöveti szinten a következő reakciók léphetnek fel az implantátummal szemben: kiliökódés vagy erózió az urethrán vagy a környező szöveteken keresztül, az eszköz áthelyeződése, fisztula vagy gyulladás. Ezen reakciók bármelyikének fellépése esetén a szalag teljes eltávolítása válhatalmú szükségessé.

Mint minden idegen test, a polipropilén háló is súlyosbíthat egy már meglévő gyulladást vagy diszpareuniát.

A túlkorrekció esetenként az alsó húgyutak átmeneti vagy állandó elzáródását és a vizelet elzáródását okozhatja.

Az inkontinencia kezelését célzó sebészeti beavatkozások ismert kockázatai közé tartoznak az akut krónikus fájdalom, a vagina sebesedése, a háló kilökődése, fertőzés, erózió, de novo vizelési inger, diszpareunia, az eszköz elvándorlása, a beavatkozás visszaeséssel járó teljes kudarca. Ezen komplikációk kezelése egy, vagy akár több műtétet is igényelhet, és bizonyos komplikációk lehet, hogy egyáltalán nem korrigálhatók teljesen.

### **HASZNÁLATI FIGYELMEZTETÉSEK**

A LIFT®Kit eszközt csak szakképzett sebész ültetheti be, aki jól ismeri az eszköz használatát (megfelelő nőgyógyászati, urológiai, anatómiai és sebészeti ismeretek szükségesek).

A LIFT®Kit implantátum, felvezető eszköz és vezető steril állapotban kerülnek kiszállításra (etilén oxid sterilizáció). Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a csomagolás sérültlen (ha a címke vagy a védőcsomagolás sérült, ne használja). Ne használjon sérült eszközt.

A szalagot fedő műanyag tok eltávolítandó, nem beültetendő.

Ne használja újra és ne sterilizálja újra az implantátumot, a felvezető eszközt vagy a vezetőt.

### **FONTOS: NE HASZNÁLJA ÚJRA - NE STERILIZÁLJA ÚJRA**

Ahogy az a címkén is feltüntetésre került, az implantátum, a felvezető eszköz és a vezető egyszer használatosak. Semmilyen körülmenyek között nem használhatóak újra és nem sterilizálhatóak újra (néhány lehetséges kockázat: termék sterilitásának elvesztése, fertőzés kockázata, termék hatékonyságának elvesztése, visszaesés).

### **TÁROLÁS**

Száraz, Óvja a közvetlen napfénytől, szobahőmérsékleten, eredeti csomagolásban.

### **FONTOS!**

A termék felhasználásával kapcsolatos további információért forduljon COUSIN BIOTECH képviselőjéhez vagy terjesztőjéhez.

### **A BERENDEZÉSEK EXPLANTÁCIÓJA ÉS ELTÁVOLÍTÁSA**

Az explantációnak és a kezelésnek az ISO 12891-1:2015 „sebészeti implantátumok - sebészeti implantátumok visszanyerése és elemzése” szabvány 1. részében: „Visszanyerés és kezelés” szereplő ajánlások betartásával kell történnie. minden eltávolított berendezést vissza kell küldeni elemzésre a jelenlegi protokollnak megfelelően. Ez a protokoll kérésre rendelkezésre áll a COUSIN BIOTECH-nél. Fontos megjegyezni, hogy bármely implantátumot mely nem került megtisztításra és fertőtlenítésre, lezárt csomagban kell beküldeni. Az eltávolított orvosi eszköz ártalmatlanítását a fertőzésveszélyes hulladék ártalmatlanítási országában érvényben lévő szabványoknak megfelelően kell elvégezni. A nem beültetett berendezés ártalmatlanítására nem vonatkoznak külön ajánlások. A második bekezdés az információkérés vagy panaszok esetére szolgál.

### **INFORMÁCIÓKÉRÉS ÉS PANASZ**

Minőségügyi szabályzatát követve a COUSIN BIOTECH elkötelezett az iránt, hogy a magas minőségű orvosi eszközök gyártása és szállítása érdekében minden erőfeszítést megtegyen. Azonban, ha egy egészségügyi szakember (ügyfél, felhasználó, beutaló orvos stb.) panaszt nyújt bevagy elégedetlenségre van oka egy termék minősége, biztonságossága vagy teljesítménye terén, a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatnia kell a COUSIN BIOTECH-et. Valamely implantátum meghibásodása esetén, vagy amennyiben az hozzájárult a páciensen fellépő súlyos mellékhatások kialakulásához, az egészségügyi központnak követnie kell az adott országban érvényben lévő jogi eljárásokat, és a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatnia kell a COUSIN BIOTECH-et. Kérjük minden levelezésben adjon meg a referenciát, a téteszámot, a referencia koordinátáit, és az incidens vagy panasz részletes leírását. A prospektusok, a dokumentációk és a műtéti technika kérésre rendelkezésre áll a COUSIN BIOTECH-nél és a forgalmazónál.

### **IMPLANT KÁRTYA**

Az implantátumkártyát a kézhezvétel után azonnal szkennelje be, hogy elvesztése esetén nyomon követhesse.

[Tartalomjegyzék](#)

## **LIFT® Kit Suburethrale ondersteuningsband**

### **BESCHRIJVING**

De kit LIFT®Kit omvat een strop en 3 hulpuitrustingen (1 paar voor de transobturatorische en suprapubische aanpak).

Ze zijn voor eenmalig gebruik en worden steriel geleverd.

De prothese LIFT® bestaat uit een strook gebreid polypropyleen van één filament, verpakt in een plastic foedraal.

Ze wordt verlengd door zelf aanspannende lussen voor de plaatsing.

De hulpuitrustingen hebben verschillende vormen, naargelang de gekozen benadering: 1 gebogen naald voor de retropubische en suprapubische aanpak, een paar schroefvormige naalden voor de 'in-uit' en 'uit-in' transobturatorische benaderingen.

Het uiteinde van de hulpaalden heeft een gleuf voor de bevestiging van zelf aanspannende lussen.

Bij het implantaat wordt een steriele gids voor eenmalig gebruik geleverd om de doorgang van het hulpapparaat tijdens de 'in-out' transobturatorische benadering veilig te stellen.

Wanneer u de zelf aanspannende lus in de gleuf plaatst, zorg er dan steeds voor dat deze zo strak mogelijk is en dat de draad zich in de voor dit doeleinde beoogde gleuf bevindt, opdat de prothese niet van het hulpapparaat loskomt wanneer het inde weefsels van de patiënt wordt gestoken. (Zie de onderstaande figuur 1)




Fig. 1

### **MATERIALEN**

- **Prothese:** polypropyleen (gebreid monofilament)
  - **Draad:** Polyethyleentereftalaat + biocompatibele kleuring + dimethylsiloxaan
  - **Hulpapparaat:** Roestvrijstalen naald, hoes van polyoximethyleen
  - **Gids:** Polymeer van vloeibaar kristal + biocompatibele kleuring.
- Geen menselijke, noch dierlijke oorsprong - niet absorbeerbaar.**

### **INDICATIES**

De LIFT®-prothese is ontworpen voor gebruik als een suburethrale ondersteuning voor chirurgische behandeling van vrouwen middels vaginale benadering.

### **PRESTATIES**

Deze biocompatibele, niet biologisch afbreekbare prosthesen veroorzaken reactieve fibrose die een bijkomende urethrale ondersteuning produceren.

Deze prosthesen zijn eenvoudig in te brengen dankzij hun speciaal ontworpen vorm, uitstekende flexibiliteit en optimale, snelle kolonisatie en integratie.

### **CONTRA-INDICATIE**

Niet implanteren in de volgende gevallen:

- Allergie voor een der bestanddelen
- Bij vrouwen die antistollingstherapie ontvangen
- Infectie van het urinekanaal
- Zwangere vrouwen
- Kinderen van onvolwassen botleeftijd

Iedere patiënt die mogelijkwijze zwanger is, dient gewaarschuwd te worden dat zwangerschap het voordeel van de ingreep teniet kan doen.

### **NEVENEFFECTEN**

Zoals alle medische implantaten kan dit product tot neveneffecten leiden, zoals:

Perforatie of beschadiging van bloedvaten, blaas, rectum, intraperitoneale organen of zenuwen.

Zoals bij alle implantaten kan zich een plaatselijke irritatie en/of een reactie op het vreemde lichaam voordoen.

Op het niveau van het weefsel kunnen reacties op het implantaat vaginale extrusie, erosie door de urethra of omgevende weefsels, verschuiving van het apparaat, fistels of ontsteking omvatten. Indien een dergelijke reactie optreedt, kan het noodzakelijk zijn de strop geheel en al te verwijderen.

Zoals alle vreemde lichamen kan de strop van polypropyleen een reeds aanwezige infectie of dyspareunie verergeren. Overcorrectie kan tot een tijdelijke of permanente blokkade van het lagere urinekanaal en tot retentie van urine leiden. De bekende risico's van een chirurgische ingreep voor de behandeling van incontinentie omvatten acute of chronische pijn, littekenvorming in de vagina, retractie van de mesh, infectie, erosie, dringende novo, dyspareunie, verplaatsing van de apparatuur, de totale mislukking van de ingreep die kan leiden tot een terugval. Een of meerdere herhaalde chirurgische ingrepen kunnen eveneens nodig zijn om deze complicaties te behandelen, en sommige complicaties kunnen niet altijd volledig verbeterd worden.

### **VOORZORGSMATREGELEN BIJ GEBRUIK**

Het apparaat LIFT® Kit mag enkel door gekwalificeerde chirurgen worden geïmplanteerd (kennis van gynaecologische en urologische anatomie en chirurgie), die met het apparaat uiterst vertrouwd zijn.

Het implantaat LIFT® Kit, de gids en de hulpuitrusting worden steriel geleverd (sterilisatie met ethyleenoxide). Controleer of de verpakking intact is alvorens te gebruiken (niet gebruiken indien de etiketten en/of beschermende verpakking beschadigd zijn). Niet gebruiken indien het apparaat beschadigd is.

Het plastic foedraal dat de strop bedekt, moet verwijderd worden en mag niet geïmplanteerd worden.

Het implantaat, de gids en de hulpuitrusting niet hergebruiken of opnieuw steriliseren.

### **BELANGRIJK: NIET HERGEBRUIKEN – NIET OPNIEUW STERILISEREN**

Zoals op de productetikettering aangegeven, zijn het implantaat, de gids en de hulpuitrusting voor eenmalig gebruik bedoeld. In geen geval mogen ze hergebruikt en/of opnieuw gesteriliseerd worden (mogelijke risico's omvatten: verlies van productsteriliteit, risico voor infectie, verlies van doeltreffendheid, hervall).

### **OPSLAG**

Op te slaan op een droge plaats uit de buurt van licht houden, bij kamertemperatuur, in zijn oorspronkelijke verpakking.

### **BELANGRIJK**

Gelieve voor meer informatie omtrent het gebruik van dit product contact met uw vertegenwoordiger of distributeur van COUSIN BIOTECH op te nemen.

### **"EXPLANTATIE EN VERWIJDERING VAN HULPMIDDELEN"**

Verwijderen en verwerken moet gebeuren volgens de aanbevelingen van ISO 12891-1:2015 "Implantaten voor chirurgie - Ophalen en analyseren van chirurgische implantaten" - Deel 1: « Ophalen en verwerken ». Elk verwijderd apparaat moet teruggestuurd worden voor analyse, volgens het huidige protocol. Dit protocol is op aanvraag verkrijgbaar bij COUSIN BIOTECH. Het is belangrijk op te merken dat elk implantaat dat niet voor de verzending gereinigd en gedesinfecteerd is, in een verzegelde verpakking moet zitten. De verwerking van verwijderde medische hulpmiddelen moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de in het land geldende normen voor de verwerking van afval met een besmettingsgevaar. De verwijdering van een niet-geïmplanteerd apparaat volgt geen specifieke aanbevelingen. De tweede alinea is in geval van een informatieverzoek of klacht.

### **INFORMATIEVERZOEK EN -CLAIM**

COUSIN BIOTECH streeft ernaar om in het kader van haar kwaliteitsbeleid alles in het werk te stellen om een medisch apparaat van hoge kwaliteit te produceren en te leveren. Echter, als een gezondheidsprofessional (klant, gebruiker, voorschrijver ...) een klacht heeft of een reden tot ontevredenheid over een product in termen van kwaliteit, veiligheid of prestaties, moeten zij COUSIN BIOTECH zo snel mogelijk op de hoogte brengen. In geval van een defect aan een implantaat of als het bijdraagt tot ernstige nadelige gevolgen voor de patiënt, moet het gezondheidscentrum de wettelijke procedures in zijn land volgen en COUSIN BIOTECH zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Voor elke vorm van correspondentie, specificeer gelieve de referentie, het partijnummer, de coördinaten van een referentie en een uitgebreide beschrijving van het incident of de claim. Brochures, documentatie en operatietechnieken zijn op aanvraag verkrijgbaar bij COUSIN BIOTECH en haar distributeurs.

### **IMPLANTKAART**

Zorg ervoor dat u uw implantaatkaart onmiddellijk na ontvangst scant, zodat u deze kunt volgen in geval van verlies.

### **Overzicht**

## Instrukcja obsługi

### **LIFT® Kit** **Taśma podtrzymująca podcewkowa**

#### **OPIS**

Zestaw LIFT® Kit składa się z taśmy i z trzech 3 wspomagań (1 para dla techniki transobturacyjnej i 1 wspomaganie dla dojść nadłonowych i łożowych wstecznych).

Są jednorazowego użytku i dostarczane w stanie sterylnym.

Proteza LIFT® składa się z taśmy z polipropylenowego włókna typu monofilament, dzianego, konfekcjonowanej w powłoce z tworzywa sztucznego. Jest przedłużona pętlami samozaciskowymi umożliwiającymi jej umieszczenie na swoich zakończeniach.

Wspomagania mają różne kształty, według wybranego dojścia: 1 igła zakrzywiona dla dojść łożowych wstecznych i nadłonowych, para igieł spiralnych dla dojść transobturacyjnych in-out i out-in.

Zakończenie igieł wspomagań wyposażone jest w nacięcie umożliwiające mocowanie pętli samozaciskających

Jedno prowadzenie, jednorazowego użytku i dostarczone w stanie sterylnym, dostarczone jest z implantem dla zabezpieczenia przeprowadzenia wspomagania dojściem transobturacyjnym in-out.

Podczas umieszczania pętli samozaciskowej w nacięciu, zawsze upewniać się, że zaciśnięcie zostało wykonane maksymalnie i że nitka znajduje się na pewno w przewidzianym w tym celu nacięciu, tak, aby proteza nie uległa odłączeniu od wspomagania podczas przejścia w tkankach pacjentki. (Patrz figura 1 poniżej)




Fig 1

#### **MATERIAŁY**

- **Proteza :** Polipropylen (monofilament dziany)
- **Nici:** Tereftalan polietylenu + barwnik biokompatybilny + dwumetyl siloksanu
- **Wspomaganie :** Igła ze stali nierdzewnej, uchwyt polioksymetylenowy
- **Prowadzenie:** Polimer ciekłokrystaliczny + barwnik biokompatybilny.

**Pochodzenie ani ludzkie, ani zwierzęce - Nie wchłanialne.**

#### **WSKAZANIA**

Proteza LIFT® jest przeznaczona do stosowania jako taśma podtrzymująca podcewkowa de leczenia chirurgicznego wysiłkowego nietrzymania moczu dojściem przez pochwowy u kobiety.

#### **WYNIKI DZIAŁANIA**

Te protezy, biokompatybilne i nie ulegające biodegradacji, powodują zwłóknienie reaktywne skutkujące solidnym wzmacnieniem ścianki.

Zaletą tych protez jest łatwość ich umieszczania dzięki dostosowanemu kształtu, bardzo dobrej podatności, optymalnej i szybkiej integracji i kolonizacji.

#### **PRZECIWWSKAZANIA**

Nie dokonywać implantacji w następujących przypadkach :

- Alergia na jeden ze składników
- U kobiety leczonej antykoagulantem
- Infekcja dróg moczowych
- Kobieta w ciąży
- Dziecko podczas wzrostu

Pacjentka mogąca zajść w ciążę musi zostać uprzedzona, że ciąża może spowodować anulowanie korzyści z interwencji.

#### **MOŻLIWE SKUTKI NIEPOŻĄDANE**

Jak w przypadku każdego medycznego urządzenia implantowanego, ten implant może spowodować drugorzędne, niepożądane skutki, takie jak:

Przebitie lub uszkodzenie naczyń krwionośnych, pęcherza, organów śródotorzowych, nerwów

Przy wszystkich implantacjach może pojawić się miejscowe podrażnienie związane z zabiegiem i/lub reakcją na ciało obce.

Na poziomie tkanek, reakcje na implant mogą zawierać wyciskanie, erozję poprzez cewkę moczową lub otaczające tkanki, migrację urządzenia poza pożądane usytuowanie, tworzenie się przetoki lub stanu zapalnego. W przypadku wystąpienia takiej reakcji, może okazać się koniecznym całkowite wycofanie taśmy.

Tak jak w przypadku ciała obcego, taśma polipropylenowa może uaktywnić wcześniejszą infekcję.

Nadmierne poprawianie może spowodować obstrukcję czasową lub trwałą dołu układu moczowego i zatrzymanie. Znane zagrożenia zabiegu chirurgicznego przy leczeniu nietrzymania moczu, obejmują ból, infekcję, erozję, nagłą potrzebę de novo, bolesny stosunek płciowy, migrację urządzenia, całkowite niepowodzenie zabiegu powodujące recydywę.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY STOSOWANIU**

Urządzenie LIFT®Kit musi być wszczepione wyłącznie przez wykwalifikowanego chirurga (znajomość anatomicznej oraz chirurgii ginekologicznej i urologicznej) mającego doskonale urządzenie, jego przewidywane zastosowanie, instrumenty i technikę chirurgiczną. Implant, prowadzenie i wspomagania LIFT®Kit są dostarczane jako sterylnie (sterylizacja tlenkiem etylenu); sprawdzić nienaruszalność opakowania przed wszelkim zastosowaniem (nie używać w razie uszkodzenia etykiet zapewniających nienaruszalności i/lub opakowania ochronnego). Nie używać jeśli urządzenie jest uszkodzone.

Osłona z tworzywa sztucznego obejmująca taśmę musi koniecznie zostać usunięta i nie być implantowana.

Nie używać i nie sterylizować ponownie implantu, prowadzenia i wspomagań.

### **WAŻNE: NIE STOSOWAĆ PONOWNIE - NIE STERYLIZOWAĆ PONOWNIE**

Zgodnie z etykietą tego produktu, implant, prowadzenie, wspomagania są jednorazowego użytku. Nie mogą w żadnym wypadku być używane ponownie i/lub ponownie sterylizowane (potencjalne zagrożenia zawierające ale nie ograniczające się do: utraty sterility produktu, zagrożenia infekcją, utraty skuteczności produktu, recydywy)

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU**

Przechowywać w suchym miejscu, chronionym przed światłem od słońca i o temperaturze pokojowej, w swoim oryginalnym opakowaniu.

### **WAŻNE**

W sprawie wszelkich informacji uzupełniających związanych ze stosowaniem tego produktu, prosimy o kontaktowanie się ze swoim przedstawicielem lub dostawcą COUSIN BIOTECH.

### **USUWANIE I UTYLIZACJA IMPLANTU**

Usuwanie implantu i postępowanie z nim powinno być zgodnie z zaleceniami określonymi w normie ISO 12891-1:2015 „Wszczepy chirurgiczne – wyciąganie i analiza implantów chirurgicznych” sekcja 1: « Wyciąganie i postępowanie ».

Każdy usunięty implant musi zostać zwrócony do analizy zgodnie z aktualnym protokołem. Protokół ten można uzyskać od COUSIN BIOTECH. Prosimy pamiętać, aby nie czyścić i nie dezynfekować implantu przed wysyłką, umieścić go w szczelnym opakowaniu.

Usunięte wyroby medyczne należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju, mającymi zastosowanie względem unieszkodliwiania odpadów zakaźnych.

W odniesieniu do utylizacji niewszczepionego implantu nie ma żadnych konkretnych zaleceń.

### **UZYSKANIE INFORMACJI I ZGŁASZANIE REKLAMACJI**

Zgodnie z przyjętą polityką jakości COUSIN BIOTECH zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wyprodukować i dostarczyć wyroby medyczne wysokiej jakości. Jednak jeżeli pracownikowi służby zdrowia (klient, użytkownik, lekarz przepisujący itp.) zgłoszono reklamację lub jest on niezadowolony z produktu pod względem jakości, bezpieczeństwa czy skuteczności, powinien niezwłocznie poinformować COUSIN BIOTECH o tym fakcie. W przypadku wadliwego działania implantu lub jeżeli spowodował on poważne, niepożądane skutki dla pacjenta, ośrodek zdrowia powinien postępować zgodnie z procedurami prawnymi w danym kraju i niezwłocznie zawiadomić COUSIN BIOTECH o tym fakcie.

W korespondencji należy podać numer referencyjny, numer partii, dane personalne doradcy i pełny opis incydentu lub reklamacji.

Broszury, dokumentację i opis technik zabiegów chirurgicznych można uzyskać w firmie COUSIN BIOTECH i u dystrybutorów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy skontaktować się z przedstawicielem lub dystrybutorem COUSIN BIOTECH lub bezpośrednio pod adresem: contact@cousin-biotech.com.

### **KARTA IMPLANTU**

Należy zeskanować kartę implantu natychmiast po jej otrzymaniu, aby móc ją śledzić w przypadku utraty.

### **Streszczenie**

## **LIFT® Kit** **Suburetrálna podporná páska**

**OPIS**

Súpravu LIFT® Kit tvorí slučka a 3 pomocné zariadenia (1 pári pre transoburátoru techniku a 1 pre retropubická a suprapubická prístup). Sú na jednorazové použitie a dodávajú sa sterilné.

Protézu LIFT® tvorí prúžok pleteného monofibrilného propylénu, baleného v plastovom puzdre.


Je predĺžená samo doťahovacími slučkami k zavedeniu.

Pomocné zariadenia majú rôzne tvaru v závislosti na zvolenom postupe: 1 zahnutú ihlu pre retropubická a suprapubická prístup, pári špirálových ihiel pre vstup a výstup a vstup pri transobturatornych postupoch.

Koniec pomocných ihiel má otvor pre upevnenie samo utáhovacích kľučiek.

Jednorazový sterilný vodič sa dodáva s implantátom pre zabezpečenie priechodu pomocného zariadenia počas vstupu / výstupu pri transobturatornom postupe.

Pri umiestnení samo utáhovacích kľučiek do otvoru vždy skontrolujte, že sú maximálne tesne a že závit je v otvore k tomu určenému, a protéza sa tak pri prieniku tkanicami nevyvlečú. (Pozrite obr. 1 nižšie).



Obr. 1

**MATERIÁLY**

- **Protéza:** polypropylén (monofibrilné vlákno)
- **Závit:** Polyetylén tereftalát + biokompatibilné barvivo + dimetyl siloxan
- **Pomocné zariadenie:** Ihla z nerezovej ocele, plyoxemtylenové puzdro
- **Navádzanie:** Kvapalný polymér + biokompatibilné farbivo.

**Pôvod nie je ľudský ani zvierací - nevstrebáva sa.**

**OZNAČENIE**

Protéza LIFT® je navrhnutá na použitie ako suburetrálne oporné oko pre chirurgický vaginalné zákrok u žien.

**VÝKON**

Tieto biologicky kompatibilné, nerozložiteľné protézy spôsobujú reakčnej fibrózu, ktorá vyvoláva dodatočnú uretrálnu podporu.

Tieto protézy sa ľahko zavádzajú vďaka špeciálne navrhnutému tvaru, vynikajúcej flexibiliite a optimálnej, rýchlej kolonizácii a integrácii.

**KONTRAINDIKÁCIE**

Nezavádzajte v nasledujúcich prípadoch:

- Alergia na niektorý z komponentov
- U žien podstupujúcich antikoagulačnú liečbu.
- Infekcia močových ciest
- Tehotné ženy
- Skeletálne nevyspelé deti

Pacientka, ktorá by mohla otehotniť, musí byť upozorená, že tehotenstvo môže výhody procedúry narušiť.

**VEDLAJIE ÚČINKY**

Rovnako ako všetky implantáty, aj tento produkt môže viesť k nežiaducim účinkom, napr.:

Perforácia alebo poškodenie ciev, mechúra, konečníka, intraperitoneálnych orgánov alebo nervov.

Rovnako ako u všetkých implantátov, aj v tomto prípade môže dôjsť k lokálnemu podráždeniu a/alebo reakcii na cudzí predmet v tele. Medzi reakcie na implantát môže patriť vaginalná extrúzie, preniknutie cez močové alebo okolité tkanicá, premiestnenie zariadenia, fistula, alebo zápaly. Pokial dôjde k takejto reakcii, je nutné implantát vybrať.

Rovnako ako v prípade všetkých cudzích predmetov v tele, aj v tomto prípade môže dôjsť k vyvolaniu preexistujúci infekcie alebo dyspareunii.

Nadmerné opravy môžu viesť k dočasnej alebo trvalej obstrukcii v spodnom močovom trakte a k retencii moči.

K známym rizikám operácie na liečbu inkontinencie patrí akútна alebo chronická bolest, skarifikácia pošvy, stiahnutie sietky, infekcia, erózia, de novo urgentný syndróm, dyspareunia, migrácia pomôcky a úplné zlyhania zákroku vedúce k recidíve. Tiež môže byť

nevyhnutné vykonať jednu alebo viaceré operácie na liečbu týchto komplikácií, keďže nie vždy dôjde k úplnému napraveniu niektorých komplikácií.

### **UPOZORNENIE PRED POUŽITÍM**

Zariadenie LIFT®Kit musí byť implantované len skúsenými chirurgmi (so znalosťami gynekologické a urologické anatómie a chirurgie), ktorí majú so zariadením značné skúsenosti.

Implantát LIFT®Kit, navádzacie zariadenia a pomocné zariadenia sa dodávajú sterilné (sterilizácia etylénoxidom). Pred použitím skontrolujte, či nie je obal porušený (nepoužívajte, v prípade poškodenia štítkov a/alebo ochranného obalu). Nepoužívajte ak je zariadenie poškodené.

Plastové puzdro, ktoré zakrýva oko musí byť sňaté a nesmie byť implantované.

Implantát, palubný počítač a pomocné zariadenia nepoužívajte znova ani ho znova nesterilizujte.

### **DÔLEŽITÉ: NEPOUŽÍVAJTE ZNOVU - ZNOVU NESTERILIZUJTE**

Ako je uvedené na balení, implantát, palubný a pomocné zariadenia sú určené na jednorazové použitie. V žiadnom prípade nesmie byť znovu použitá ani znova sterilizovaná (medzi možné riziká patrí, ale nielen: strata sterility výrobku, riziko infekcie, strata účinnosti, relaps).

### **SKLADOVANIE**

Skladujte na tmavom mieste, mimo pôsobenia svetla, pri izbovej teplote, v originálnom balení.

### **DÔLEŽITÉ**

Pre viac informácií o tomto produkte kontaktujte zástupcu alebo distribútoru COUSIN BIOTECH.

### **EXPLANTOVANIE A LIKVIDÁCIA IMPLANTÁTOV**

Explantovania a manipulácie by mali prebiehať podľa nasledujúcich odporúčaní ISO 12891-1:2015 "chirurgické implantáty - Vyberanie a analýzy chirurgických implantátov" Časť 1: "Vyberanie a manipulácia".

Každé explantované zariadenie musí byť zaslané späť na analýzu podľa aktuálneho protokolu. Tento protokol je k dispozícii na vyžiadanie u spoločnosti COUSIN BIOTECH.

Pripomíname, že implantát nesmie byť pred odoslaním vyčistený, ani vydezinfikovaný a musí byť zabalený v uzavretom obale.

Likvidácia explantovaného zdravotníckeho zariadenia musí byť vykonaná v súlade s normami o likvidácii odpadov s infekčným nebezpečenstvom platnými v danej krajine.

Likvidácia neimplantovaných zariadení nie je predmetom konkrétneho odporúčania.

Druhý odsek sa týka žiadosti o informácie alebo reklamácie.

### **ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE A REKLAMÁCIA**

V rámci svojej politiky kvality sa spoločnosť COUSIN BIOTECH zaväzuje, že sa bude usilovať o vynaloženie všetkého úsilia pri výrobe a poskytovaní vysoko kvalitného zdravotníckeho zariadení.

Ak je však zdravotnícky odborník (záklazník, užívateľ, lekár...) nespokojný s kvalitou výrobku, jeho bezpečnosťou alebo výkonnosťou, alebo si praje výrobok reklamovať, musí v čo najkratšom čase o tejto skutočnosti informovať spoločnosť COUSIN BIOTECH.

Ak dôjde k zlyhaniu implantátu, alebo ak spôsobí implantát pacientovi závažné nežiaduce účinky, musí zdravotnícke stredisko dodržať právne postupy platné v danej krajine a v čo najkratšom čase o tejto skutočnosti informovať spoločnosť COUSIN BIOTECH.

V korešpondencii prosím uved'te referenčné číslo, číslo šarže, identifikačné údaje referencie a zrozumiteľný opis incidentu alebo reklamácie.

Brožúry, dokumentácia a chirurgické postupy sú k dispozícii na požiadanie u spoločnosti COUSIN BIOTECH a jej distribútorov.

### **IMPLANT CARD**

Nezabudnite si ihned po prijatí naskenovať kartu implantátu, aby ste ju mohli sledovať v prípade straty

### **Zhrnutie**

## **LIFT® Kit** **Suburetrální páska**

**POPIS**

Sadu LIFT®Kit tvoří pásek a křídýlkový zavaděč, 3 pomocná zařízení (1 páru pro transobturatorní techniku a 1 pro retropubický a suprapubický přístup).

Slouží k jednorázovému použití, dodává se sterilní.


Protézu LIFT® tvoří pásek z monofibrilního vlákna, zabalený do plastového pouzdra. Je prodloužený samoutahovacími smyčkami.

Pomocná zařízení mají různé tvary, v závislosti na zvoleném přístupu: 1 zakřivená jehla pro retropubický a suprapubický přístup, páru helikálních jehel pro vstup a výstup a transobturární přístupy.

Konec pomocných jehel má otvor pro upevnění samoutahovacích oček.

K jednorázovém použití, dodává se se sterilním zaváděcím zařízením k zajištění průchodu přídavného zařízení během transubtorárního přístupu.

Při vložení samoutahovacího očka do otvoru se vždy ujistěte, že je co nejtěsnější, a že očko je v otvoru k tomu určenému, aby se protéza nedostala při průchodu tkáněmi z přídavného zařízení. (Viz obrázek níže)



Obr. 1

**MATERIÁLY**

- **Protéza** polypropylen (monofibrilní vláknový)
- **Vlákno:** Polyetylénnaftalát + biokompatibilní barvivo + dimethylsiloxan
- Pomocné zařízení: Jehla z nerezové oceli, polynomický držák
- Pouzdro: Polymer z tekutých krystalů + biologicky kompatibilní barvivo.

**Ani lidský ani zvířecí původ - nevstřebatelné.**

**INDIKACE**

Protéza LIFT® je navržena k použití jako subuterální podpora okolo pro chirurgické ošetření při vaginálním přístupu.

**VÝKON**

Tyto biologicky kompatibilní, biologicky nerozložitelné protézy způsobují reaktanční fibrózu, která vytváří další uretrální podporu. Tyto protézy se snadno zasunují díky jejich speciálnímu tvaru, vynikající flexibilitě a optimální, rychlé kolonizaci a integraci.

**KONTRAINDIKACE**

Nepoužívejte v následujících případech:

- Alergii na některý z komponentů
- Ženy užívající antikoagulanty.
- Infekce močových cest
- Těhotná žena
- Kosterjně nedozrálé děti

Pacientky, které by mohly případně otěhotnět, musí být upozorněny, že těhotenství může výhody postupu zrušit.

**VEDLEJŠÍ ÚČINKY**

Stejně jako ostatní implantáty, i tento produkt může způsobit vedlejší účinky, např.:

Perforace nebo poškození tepen, měchýře, rektu, itraperitoneálních orgánů nebo nervů. Stejně jako ostatní implantáty mohou způsobit lokální podráždění a/nebo reakci na cizí těleso.

Na úrovni tkání mohou reakce způsobit vaginální extruzi, oděrky na měchýři nebo na okolních tkáních, přemístění zařízení, fistuly nebo záněty. Pokud dojde k jakékoli reakci, bude třeba provést kompletní výměnu.

Stejně jako všechna cizí tělesa, polypropylénové očko může zhoršit již existující infekci nebo dyspareunii.

Překorigování může vést k dočasnemu nebo trvalému vzniku překážky ve spodní části měchýře a zadržování moči.

zařízení, celkové selhání zásahu vedoucí k relapse. K léčbě těchto komplikací může být rovněž nutné provést jednu nebo více operací, neboť některé komplikace nemusí být odstraněny najednou.

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ**

Zařízení LIFT®Kit musí být implantováno kvalifikovanými chirurgy, kteří mají znalosti gynekologické a urinární anatomie a chirurgie a kteří jsou se zařízením opravdu dobře seznámeni.

Zaváděcí nástroj LIFT®Kit a přídavná zařízení se dodávají sterilní (sterilizace etylénoxidem). Před použitím zkонтrolujte, zda není balení narušené (nepoužívejte v případě poškození štítků a/nebo ochranného balení). Nepoužívejte je-li zařízení poškozené. Plastové pouzdro, které očko zakrývá musí být sejmuto a nesmí být implantováno.

Implantát, zaváděcí nástroj a přídavná zařízení znova nepoužívejte ani nesterilizujte.

#### **DŮLEŽITÉ: NEPOUŽÍVAT ZNOVU - ZNOVU NESTERILIZOVAT**

Jak je uvedeno na štítku, implantát, zaváděcí nástroj a přídavná zařízení jsou určena k jednorázovému použití. V žádném případě nesmí být používány znova ani nesmí být znova sterilizovány (mezi potenciální rizika patří, ale nejen: ztráta sterility produktu, nebezpečí infekce, ztráta účinnosti, relaps).

#### **SKLADOVÁNÍ**

Musí být skladována na suchém místě, Uchovávejte mimo dosah světla a při pokojové teplotě, v originálním balení.

#### **DŮLEŽITÉ**

Pro více informací o použití tohoto produktu kontaktujte svého zástupce nebo distributora společnosti COUSIN BIOTECH.

#### **VYJMUTÍ A LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ**

Vyjmutí a manipulace musí být provedeno v souladu s doporučenimi ISO 12891-1:2015 «Implantáty k operaci - Převzetí a analýza chirurgických implantátů» Část 1: «Převzetí a manipulace».

Jakékoli explantované zařízení musí být odesláno zpět k analýze, v souladu s platným protokolem. Tento protokol je k dispozici na vyžádání u COUSIN BIOTECH. Je důležité poznamenat, že jakékoli implantát, který nebude před odesláním vyčistěn nebo dezinfikován, musí být zabalen do zapečetěného obalu.

Likvidace vyjmutého zdravotnického zařízení musí být provedena v souladu se standardy země, které se týkají likvidace infekčního odpadu.

Likvidace neimplantovaného zařízení nepodléhá specifickým doporučením.

#### **ŽÁDOST O INFORMACE A STÍŽNOSTI**

V souladu se s vými zásadami jakost se společnost COUSIN BIOTECH zavazuje vyvinout maximální úsilí a vrobit a dodat vysoko kvalitní zdravotnické zařízení. Nicméně, pokud zdravotnický profesionál (klient, uživatel, předepisující lékař...) má stínžosti nebo důvod být nespokojen s produktem co do kvality, bezpečnosti nebo výkonu, musí co nejdříve informovat společnost COUSIN BIOTECH. V případě selhání implantátu nebo pokud způsobí vážné nežádoucí účinky na zdraví pacienta, zdravotnické centrum musí postupovat v souladu s platnými postupy v zemi a co nejdříve informovat společnost COUSIN BIOTECH.

V případě jakékoli korespondence specifikujte referenční číslo, číslo šarže, podrobnosti a komplexní popis incidentu nebo stížnosti.

Brožury, dokumentace a chirurgické techniky jsou k dispozici na vyžádání u společnosti COUSIN BIOTECH a jejích distributorů.

Pokud potřebujete jakékoli informace, kontaktujte svého zástupce nebo distributora COUSIN BIOTECH nebo COUSIN BIOTECH přímo na contact@cousin-biotech.com.

#### **KARTA IMPLANT**

**Nezapomeňte si ihned po obdržení naskenovat kartu implantátu, abyste ji mohli sledovat pro případ ztráty.**

#### **Shnutí**

**LIFT®Kit****Banda de sustinere suburetrala****DESCRIERE**

Kit-ul LIFT® constă dintr-o bandă, un ghidaj și 3 accesorii (1 pereche pentru tehnica trans-obturator și 1 auxiliar pentru căile supra și retropubiane).

Sunt de unică folosință și se livrează sterile.

Proteza LIFT® constă dintr-o bandă de polipropilenă monofilament tricotată, ambalată într-o teacă de plastic. Este extinsă prin catarame cu autostrângere care îi permit să fie fixată la capete.

Dispozitivele auxiliare au forme diferite, în funcție de metoda aleasă: 1 ac curbat pentru metoda retropubiană și suprapubiană, o pereche de ace spirale în-out și out-in pentru tehnica transobturator.

Capătul acelor instrumentelor auxiliare este prevăzut cu o crestătură care permite atașarea buclelor de auto-închidere. În timpul transobturatorului este furnizat un ghidaj steril, de unică folosință, pentru a asigura trecerea in-out-ului auxiliar.

Când plasați bucla de auto-fixare în crestătură, asigurați-vă întotdeauna că se aplică strângerea maximă și că firul se află efectiv în crestătura dorită, astfel încât proteza să nu se separe de elementul auxiliar la trecerea prin țesutul pacientului. (A se vedea figura 1 de mai jos).




Fig 1

**MATERIALE**

- Proteză: Polipropilenă (monofilament tricotat)
- Fire: Polietilen tereflat + colorant biocompatibil + dimetil siloxan
- Accesorii: Ac din oțel inoxidabil, mâner din polioximetilen
- Ghid: polimer cu cristale lichide + colorant biocompatibil.

Nu este de origine umană sau animală - Nu este resorbabil.

**DIRECTII**

Proteza LIFT® este destinată utilizării ca sling de sprijin suburetral pentru tratamentul chirurgical al incontinenței urinare de efort vaginal feminin.

**PERFORMANȚĂ**

Aceste proteze, biocompatibile și nebiodegradabile, provoacă fibroza reactiva care duce la o armare solida a peretelui.

Aceste proteze au avantajul de a avea o instalare usoara datorita unei forme potrivite, flexibilitate foarte buna, integrare si colonizare optima si rapida.

**CONTRAINDICATII**

Nu implanăți în următoarele cazuri:

- Alergie la una dintre componente
- Femeilor sub tratament anticoagulant.
- Infecții ale tractului urinar
- Femeilor insarcinate
- Copiilor în creștere

O pacientă care ar putea fi însărcinată trebuie avertizată că sarcina riscă să anuleze beneficiul intervenției.

**EFFECTE SECUNDARE**

Ca orice dispozitiv medical implantabil, acest implant poate provoca reacții adverse nedorite, cum ar fi:

Perforarea sau deteriorarea vaselor de sânge, vezică urinare, uretri, organelor intraperitoneale, nervilor.

În toate implantările pot apărea iritații locale legate de intervenție și/sau o reacție la corpul străin.

La nivel de țesut, reacțiile la implant pot include extrudare, eroziune prin uretra sau țesuturile înconjurătoare, migrarea dispozitivului din locația dorită, formarea de fistulă sau inflamație. Dacă apare o astfel de reacție, poate fi necesară îndepărarea completă a benzii.

Ca orice corp străin, banda de polipropilenă poate activa o infecție preexistentă.

Suprarecția poate duce la obstrucția și retenția tractului urinar inferior, temporar sau permanent. Riscurile cunoscute ale intervenției chirurgicale pentru tratamentul incontinenței includ hematomul, durerea acută sau cronică, scarificarea vaginului, retracția sau eliberarea plasei, infecția, eroziunea, urgența de novo sau dificultatea de urinare, dispareunia, migrarea dispozitivului, eșecul total al procedurii, conducând la recidivă. Una sau mai multe intervenții chirurgicale pot fi, de asemenea, necesare pentru a trata aceste complicații, în timp ce unele complicații nu pot fi întotdeauna corectate complet.

### **PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE**

Dispozitivul LIFT®Kit trebuie implantat numai de un chirurg calificat (cunoștințe de anatomie și chirurgie ginecologică și urologică) pe deplin familiarizat cu dispozitivul, utilizarea prevăzută, instrumentele și tehnica chirurgicală. Implantul LIFT®Kit, ghidajul și accesoriile sunt livrate sterile (sterilizare cu oxid de etilenă); verificați integritatea ambalajului înainte de utilizare (nu utilizați în caz de deteriorare a etichetelor de siguranță și/sau a ambalajului de protecție). Nu utilizați dacă dispozitivul este deteriorat.

Învelișul de plastic care acoperă banda trebuie în mod obligatoriu îndepărtat și nu implantat.

Nu reutilizați și nu resterilizați implantul, ghidajul și accesoriile.

### **IMPORTANT: NU REUTILIZATI - NU RESTERILIZATI**

În conformitate cu etichetarea acestui produs, implantul, ghidajul, accesoriile sunt de unică folosință. Acestea nu trebuie reutilizate și/sau resterilizate în nicio circumstanță (riscurile potențiale includ, dar nu se limitează la: pierderea sterilității produsului, riscul de infecție, pierderea eficacității produsului, recidiva).

### **CONDITII DE DEPOZITARE**

A se pastra la loc uscat, ferit de lumina soarelui și la temperatura camerei, în ambalajul original.

### **IMPORTANT**

Pentru orice informații suplimentare despre utilizarea acestui produs, vă rugăm să contactați reprezentantul sau distribuitorul dumneavoastră COUSIN BIOTECH.

### **EXPLANTAREA SI ELIMINAREA DISPOZITIVELOR**

Următoarele recomandări trebuie respectate la explantarea și manipularea dispozitivelor: ISO 12891-1:2015 „Implanțuri chirurgicale. Îndepărțarea și analiza implanturilor chirurgicale. Partea 1: „Retragerea și manipularea”. Orice dispozitiv explantat trebuie returnat pentru analiză, în conformitate cu protocolul în vigoare. Acest protocol este disponibil la cerere de la COUSIN BIOTECH. Este important de reținut că orice implant care nu trebuie curățat sau dezinfecțiat înainte de expediere trebuie să fie într-un pachet sigilat. Eliminarea dispozitivului medical explantat trebuie efectuată în conformitate cu standardele țării în cauză pentru eliminarea deșeurilor infecțioase. Eliminarea unui dispozitiv neimplantat nu face obiectul unor recomandări specifice. Al doilea paragraf se referă la anchetă și plângeri.

### **SOLICITARI DE INFORMATII SI PLÂNGERI**

În conformitate cu politica sa de calitate, COUSIN BIOTECH se angajează să depună toate eforturile pentru a produce și furniza un dispozitiv medical de calitate. Dacă, totuși, un profesionist din domeniul sănătății (client, utilizator, prescriptor etc.) are o plângere sau un motiv de nemulțumire față de un produs, din punct de vedere al calității, siguranței sau performanței, acesta trebuie să informeze COUSIN BIOTECH cât mai curând posibil. În cazul unei defecțiuni a unui implant sau dacă acesta a contribuit la cauzarea unui efect advers grav pentru pacient, centrul de îngrijire trebuie să respecte procedurile legale în vigoare în țara sa și să informeze COUSIN BIOTECH cât mai curând posibil.


Pentru toată corespondența, vă rugăm să specificați referința, numărul lotului, datele de contact ale unui referent, precum și o descriere exhaustivă a incidentului sau reclamației. Brosurile, documentația și tehnica de operare sunt disponibile la cerere de la COUSIN BIOTECH și distribuitorii sai.

### **CARD IMPLANT**


**Asigurați-vă că scănați cardul de implant imediat după primirea acestuia, astfel încât să puteți păstra urma acestuia în caz de pierdere.**

### **Rezumat**

**Surgical Procedure / Technique Opératoire / Operationstechnik**  
**Técnica Operatoria / Procedimento cirúrgico / Técnica Operatoria /**  
**Χειρουργική Διαδικασία / Sebészeti eljárás / Chirurgische procedure**  
**Technika operacyjna / Chirurgický postup / Chirurgický postup / Procedura chirurgicala**


	<p>Surgery under local, regional or general anesthesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Empty completely the bladder before surgery.</li> <li>2. Make a 1 cm vaginal incision at the level of the medium third of the urethra.</li> <li>3. Urethro-vaginal dissection. Hook the tape on the extremity of the needle.</li> </ol> <p>Intervention sous anesthésie locale, régionale ou générale.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vidange complète de la vessie avant l'intervention.</li> <li>2. Réalisation d'une incision vaginale de 1 cm environ, en regard du tiers moyen de l'urètre.</li> <li>3. Dissection uréto-vaginale. Accrocher la bandelette sur l'extrémité de l'aiguille.</li> </ol> <p>Eingriff unter lokaler bzw. regionaler Anästhesie oder Vollnarkose durchführen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vor dem Eingriff muss die Blase völlig geleert werden.</li> <li>2. Einen ca. 1 cm langen Vaginaleinschnitt gegenüber dem mittleren Drittel des Harnleiters durchführen.</li> <li>3. Harnleiter-Vaginalsektion. Das Band am Ende der Nadel anhängen.</li> </ol> <p>Intervento sotto anestesia locale, regionale o generale.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Svuotamento completo della vescica prima dell'intervento</li> <li>2. Viene realizzata una incisione di 1 cm circa al lato del 3° medio dell'uretra.</li> <li>3. Dissezione uretrogavaginale Attaccare la striscia sull'estremità dell'ago.</li> </ol> <p>Intervención bajo anestesia local, regional o general.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vaciado completo de la vejiga antes de la intervención.</li> <li>2. Realizar una incisión vaginal de aproximadamente 1 cm, con respecto al tercio medio de la uretra.</li> <li>3. Disección uretrog vaginal. Enganchar la banda en el extremo de la aguja.</li> </ol> <p>Intervenção sob anestesia local, regional ou geral.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esvaziamento total da bexiga antes da intervenção.</li> <li>2. Realização de uma incisão vaginal de cerca de 1 cm, face ao terço da uretra.</li> <li>3. Dissecção uretrog vaginal. Fixar a tela sobre a extremitade da agulha.</li> </ol>	<span style="font-size: small;">en</span> <span style="font-size: small;">fr</span> <span style="font-size: small;">de</span> <span style="font-size: small;">it</span> <span style="font-size: small;">es</span> <span style="font-size: small;">pt</span>
--	---	--

**Informações preliminares**  
**Προκαταρκτικές πληροφορίες**  
**Előzetes információ**  
**Voorafgaande informatie**  
**Informacije wstępne**  
**Predbežné informácie**  
**Předběžná informace**  
**Informatii preliminare**


	<p>Χειρουργική επέμβαση με τοπική, περιφερειακή ή γενική αναισθησία.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Η κύστη πρέπει να είναι τελείως άδεια πριν από την επέμβαση.</li> <li>Πραγματοποιήστε μια κολπική τομή 1 cm στο επίπεδο του μεσαίου τρίτου της ουρήθρας.</li> <li>Ουρηθροκολπική διατομή.</li> </ol> <p>Στερεώστε την ταινία στο άκρο της βελόνας.</p> <p>Sebészeti beavatkozás helyi, területi vagy általános érzéstelenítésben.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A hólyag teljesen üres legyen a műtét előtt.</li> <li>Ejtsen 1 cm-es vaginális bemetszést az urethra középső szakaszán.</li> <li>Urethro-vaginális bemetszés.</li> </ol> <p>Rögzítse a szalagot a tű végződéséhez.</p> <p>Operatie onder plaatselijke, regionale of algehele verdoving.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ledig de blaas volledig vóór de operatie.</li> <li>Maak een vaginale incisie van 1 cm ter hoogte van het middelste derde deel van de urethra.</li> <li>Urethrovaginale dissectie.</li> </ol> <p>Haak de band aan het uiteinde van de naald.</p> <p>Zabieg przy znieczuleniu miejscowym, regionalnym lub ogólnym.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Całkowite opróżnienie pochwy przed zabiegiem.</li> <li>Wykonanie nacięcia pochwego około 1 cm, naprzeciw średnio jednej trzeciej cewki moczowej.</li> <li>Dysekcja cewkowo-pochwowa.</li> </ol> <p>Zaczepić taśmę do zakończenia igły.</p> <p>Operácie pri lokálnej, čiastočnej alebo úplnej anestézii .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mechúr pred operáciou úplne vyprázdnite .</li> <li>V úrovni tretiny dĺžky močovej trubice vykonajte 1 cm rez .</li> <li>Uretrovaginálny rez .</li> </ol> <p>Zaháknite pásku za kraj ihly .</p> <p>Operace při lokální, regionální nebo celkové anestezii.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Měchýř před operací zcela vyprázdněte.</li> <li>Na úrovni střední třetiny močové trubice provedte 1 cm vaginalní řez.</li> <li>Znovurozdělování tkání.</li> </ol> <p>Pásku zahákněte na nejzazší konec jehly.</p> <p>Chirurgie sub anestezie locală, regională sau generală.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Goliți complet vezica urinară înainte de operație.</li> <li>Faceți o incizie vaginală de 1 cm la nivelul treimii medii a uretrei.</li> <li>Disecția uretro-vaginală.</li> </ol> <p>Agătați banda pe extremitatea acului</p>	<p>για nu ju pl sk cs ro</p>
		

**Retropubic approach / Voie rétropubienne  
Retropubische Methode / Via retropubica  
Via retropubica / Via retropública**


	<p>Installation of the patient, anaesthesia and infiltration performed as specified on the "Preliminary Information" page</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bilateral passage of the curved ancillary in the Retzius space to position the LIFT® support tape.</li> <li>2. Cystoscopic control is done after having passed the cords on each side with out having passed the tape into the tissues.</li> <li>3. Positionning the tape.</li> <li>4. Adjustment of the tension can be done by a coughing effort.</li> <li>5. Cut the tape close to the skin; Homeostasis is checked after adjustment of the tape.</li> </ol> <p>Suture the vaginal incision with absorbable thread and suture the cutaneous incisions.</p>	en
	<p>Installation de la patiente, anesthésie et infiltration sont réalisées comme indiqué à la page «informations préliminaires»</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Passage bilatéral de l'ancillaire courbe dans l'espace de Retzius pour la mise en place de la bandelette LIFT®</li> <li>2. Contrôle cystoscopique réalisé après avoir passé les deux côtés de la bandelette dans les tissus.</li> <li>3. Mise en place de la bandelette</li> <li>4. Réglage de la tension à la toux.</li> <li>5. Section de la bandelette au ras de la peau; L'hémostase est vérifiée après réglage de la bandelette.</li> </ol> <p>Fermeture de la paroi vaginale par un surjet croisé au fil résorbable et fermeture des incisions cutanées.</p>	fr
	<p>Vorbereitung der Patientin, Anästhesie und Infiltration werden wie auf der Seite „Vorbereitende Informationen“ angegeben durchgeführt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bilaterale Einführung der gebogenen Hilfsvorrichtung in den Reziusbereich für die Einführung des LIFT® Bandes.</li> <li>2. Zystoskopische Kontrolle nach der Einführung der beiden Seiten des Bandes im Gewebe. Befindet sich ein Faden in der Harnblase, muss dieser herausgezogen werden.</li> <li>3. Einführung des Bandes durch Ziehen an den Fäden.</li> <li>4. Regulierung des Bandes durch Husten.</li> <li>5. Durchtrennung des Bandes am Hautansatz; Hämostase wird nach der Regulierung des Bandes überprüft.</li> </ol> <p>Schließung der Scheidenwand durch Kreuzstich mit resorbierenden Faden und Schließung der eingeschnittenen Haut.</p>	de
	<p>Sistematizzazione della paziente, anestesia e infiltrazione sono realizzati come indicato alla pagina « informazioni preliminari »</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Passaggio bilaterale dello strumento curvo nello spazio di Retzius per la collocazione della striscia del LIFT®</li> <li>2. Esame cistoscopico realizzato dopo aver passato i due lati della striscia nei tessuti.</li> <li>3. Collocazione della bandella.</li> <li>4. Regolazione della tensione alla tosse.</li> <li>5. Sezione della bandella rasopelle; L'emostasi viene verificata dopo la regolazione della bandella.</li> </ol> <p>Chiusura della parete vaginale mediante sopraggitto incrociato con filo riassorbibile e chiusura delle incisioni cutanee.</p>	it
	<p>La instalación de la paciente, la anestesia y la infiltración se deben realizar según se indica en la página "Información previa".</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paso bilateral del ancilar curvo en el espacio de Retzius para la colocación de la banda del LIFT®.</li> <li>2. Control citoscópico realizado tras pasar ambos lados de la banda por los tejidos.</li> <li>3. Colocación de la banda.</li> <li>4. Ajuste de la tensión a la tos.</li> <li>5. Sección de la venda a ras de la piel; La hemostasis se comprueba tras ajustar la venda.</li> </ol> <p>Cierre de la pared vaginal mediante sutura cruzada con hilo reabsorbible y cierre de las incisiones cutáneas.</p>	es
	<p>A preparação da paciente, a anestesia e a infiltração são efetuadas conforme indicado na página «informações preliminares»</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Passagem bilateral do acessório curvo no espaço de Retzius para colocação da tela LIFT®.</li> <li>2. Controle cistoscópico realizado após ter passado os dois lados da tela no tecido.</li> <li>3. Colocação da tela.</li> <li>4. O ajuste da tensão pode ser feito por esforço a tosse.</li> <li>5. Secção da tela rente à pele. A hemostase é verificada após o ajuste da tela.</li> </ol> <p>Suturar a incisão vaginal com um fio absorvível e sutura das incisões cutâneas.</p>	pt



**Οπισθοιβική προσέγγιση**  
**Retropubikus megközelítés**  
**Retropubische benadering**  
**Dojście wsteczne kowowe**  
**Retropubický prístup**  
**Retropubicky postup**

	<p>Η εγκατάσταση του ασθενούς, η αναισθησία και η διμήθηση πρέπει να εκτελούνται όπως περιγράφεται στη σελίδα «Προκαταρκτικές πληροφορίες»</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Αμφοτερόπλευρη διέλευση των κυρτών βιοηθητικών στον χώρο του Retzius για την τοποθέτηση της ταινίας υποστήριξης LIFT®.</li> <li>Ο κυνοεσκοπικός έλεγχος πραγματοποιείται μετά τη διέλευση των καλωδίων σε κάθε πλευρά χωρίς να έχει εισχωρήσει η ταινία στους ιστούς.</li> <li>Τοποθέτηση της ταινίας.</li> <li>Η προσαρμογή της τάσης μπορεί να γίνει με προσπάθεια πρόκλησης βίχα.</li> <li>Κόψτε την ταινία κοντά στο δέρμα. Η αιμόσταση ελέγχεται μετά την προσαρμογή της ταινίας.</li> </ol> <p><b>Ράψτε την κολπική τομή με απορροφήσιμο νήμα, καθώς και τις δερματικές τομές.</b></p> <p>A beteg elhelyezése, előkészítése és érzéstelenítése az "előzetes információk" rész szerint történik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bilaterálisan juttatjuk a hajlított felhelyezőt a Retzius-ba, hogy pozicionáljuk SOFT LIFT® támasztó szalagot.</li> <li>A cisztoszkópos ellenőrzés azután következik, hogy a zsinórokat minden oldalon átjutattuk, anélkül, hogy a szalag átjutott volna a szöveten.</li> <li>A szalag felhelyezése.</li> <li>A feszítettség beállítása köhögéssel történhet.</li> <li>A szalagot a bőrhöz közel vágja el. A szalag beállítása után ellenőrizze a homeostázist. Zárja a vaginális bemetszést felszívódó varrófonállal és zárja a bőrön ejtett bevágást.</li> </ol> <p>Installatie van de patiënt, anesthesie en infiltratie uitgevoerd zoals gespecificeerd op de bladzijde „Voorafgaande informatie“</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bilaterale doorgang van de gekromde hulpuitrusting in de holte van Retzius om de LIFT®-ondersteuningsband te positioneren.</li> <li>Cystoscopische controle wordt uitgevoerd nadat de koordjes aan weerszijden zijn gepasseerd zonder dat de band in de weefsels is gestopt.</li> <li>Positioneren van de band.</li> <li>De druk kan worden aangepast door pogingen tot hoesten.</li> <li>Snijd de band dicht bij de huid af; na aanpassing van de band wordt de homeostase gecontroleerd. Hecht de vaginale incisie met absorbeerbare draad en hecht de huidincisies.</li> </ol> <p>Ułożenie pacjentki, anestezja i infiltracja są wykonywane zgodnie ze wskazaniem na stronie „informacje wstępne“</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Przeprowadzenie dwustronne wspomagania zakrywionego w przestrzeni Retziusa dla umieszczenia taśmy LIFT®</li> <li>Kontrola cystokopiczna wykonana po dokonaniu przeprowadzenia obydwu stron taśmy w tkankach.</li> <li>Umieszczenie taśmy</li> <li>Regulacja naprężenia przy kaszlu</li> <li>Odcięcie taśmy równe ze skórą; sprawdzenie krwawienia po ustawnieniu taśmy.</li> </ol> <p>Zamknienie ścianki pochwy szwem krzyżowym nicią wchatlanową i zamknienie nacięć skórnnych.</p> <p>Inštalácia, anestézia a infiltrácia sa vykonajú tak, ako je uvedené na strane nazvanej «Predbežné opatrenia»</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bilaterálne priechod Vedľa Retziusova priestoru k pozícii podpornej pásky LIFT®.</li> <li>Cystoskopická kontrola sa vykoná pre presunutie pásov po každej Strane, kedy páška prejde robiť tkaniva.</li> <li>Umiestnenie pásky.</li> <li>Možno vykonať úpravu pnutia pásky.</li> <li>Pásku odřízněte do blízkosti pokožky; hemostáze se zkontrolujte po nastavení pásky.</li> </ol> <p>Vaginálné rez zašíte vstřebatelnou nití, zašíte kožní řezy.</p> <p>Anestezie pacienta má být provedena ak je uvedeno na stránce "Předběžná opatření".</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bilaterální průchod prostorem pro umístění pásky LIFT®</li> <li>Po prosunutí se provede cystoskopická kontrola, zda páška pronikla tkáněmi.</li> <li>Umístění pásky.</li> <li>Provede se nastavení pnutí pásky.</li> <li>Pásku odřízněte do blízkosti pokožky; hemostáze se zkontrolujte po nastavení pásky.</li> </ol> <p>Vaginální řez zašíte vstřebatelnou nití, zašíte kožní řezy.</p> <p>Instalaarea pacientului, anestezia și infiltrarea se efectuează conform indicațiilor de pe pagina „informații preliminare“.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Trecerea bilaterală a auxiliarului curbat în spațiul Retzius pentru instalarea de banda LIFT®</li> <li>Control cistoscopic efectuat după trecerea ambelor părți ale benzii prin țesuturi.</li> <li>Amplasarea benzii</li> <li>Reglarea tensiunii tusei.</li> <li>Secțiunea benzii la culoare cu pielea; Hemostaza este verificată după ajustarea benzii.</li> </ol> <p>Închiderea peretelui vaginal cu o sutură acoperită cu fir absorbabil și închiderea inciziilor cutanate.</p>
--	---

**Transobturator approach out-in**  
**Voie Trans-obtutatrice out-in**  
**Transobturator Methode**  
**Via transotturatoria**

	<p>Installation of the patient, anaesthesia and infiltration performed as specified on the page named «Preliminary Information 1-2-3»</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trans-obturator incisions of approximately 1 cm each, positioned at least 1 cm above the horizontal line passing by the urethral meatus at 1 cm from the ischiopubic branch.</li> <li>2. Vaginal incision and urethro-vaginal dissection.</li> <li>3. Passage of helicoid ancillary by way of the trans-obturator (blue handle). (the tunnelling device is inserted into one of the trans-obturator incisions).</li> <li>4. • Hooking of LIFT® bandage onto needle.</li> <li>5. • Passage of the tape; and heterolateral passage: performance of the 3 previous operations on the heterolateral side.</li> <li>6. • The tape is deployed by pulling on the thread. There should remain a space of about one centimetre between the tape and the urethra.</li> <li>7. • Cutting of the tape, flush with the skin at the level of the incisions. Hemostasis is checked after tensioning of the tape.</li> <li>• Closure of the vaginal wall by a crossed suture with absorbable thread and closure of the cutaneous incision.</li> </ol> <hr/> <p>Installation de la patiente, anesthésie et infiltration sont réalisées comme indiqué à la page «informations préliminaires 1-2-3».</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incisions trans-obtutatrices d'environ 1 cm chacune situées au maximum à 1 cm au dessus de la ligne horizontale passant par le méat urétral et à 1 cm de la branche ischio-pubienne.</li> <li>2. Incision vaginale et dissection uréto-vaginale.</li> <li>3. Passage de l'ancillaire hélicoïdale par voie trans-obtutatrice (manche bleu). (L'ancillaire est introduit dans une des incisions trans-obtutatrices).</li> <li>4. • Accrochage de la bandelette LIFT® sur l'aiguille</li> <li>• Passage de la bandelette ; ensuite passage contro-latéral : réalisation des 3 opérations précédentes du coté contro-latéral.</li> <li>• Mise en place de la bandelette par traction: un espace d'environ 1 cm doit être respecté entre la bandelette et l'urètre.</li> <li>5. • Section de la bandelette au ras de la peau au niveau des incisions. L'hémostase est vérifiée après réglage de la bandelette.</li> <li>• Fermeture de la paroi vaginale par un surjet croisé au fil résorbable et fermeture des incisions cutanées.</li> </ol> <hr/> <p>Vorbereitung der Patientin, Anästhesie und Infiltration werden wie auf der Seite «Vorbereitende Informationen 1-2-3» angegeben durchgeführt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einschneidung des Schließmuskels von ca. 1cm. Die Einschnitte dürfen höchstens 1cm über der Horizontallinie an der Harnröhre und höchstens 1cm an dem Pfannenrand des Hüftbeins vorbei liegen.</li> <li>2. Vaginaleinschnitt und urethro-vaginale Dissektion.</li> <li>3. Einführung des spiralförmigen Hilfsinstrumentes durch den Schließmuskelweg (blauer Griff) (Das Instrumentelle Ausrüstung wird durch eine der Schließmuskeleinschneidungen eingeführt).</li> <li>4. • Anbringung des LIFT® Bandes an der Nadel.</li> <li>• Einführung des Bandes; und heterolaterale Einführung: Durchführung der 3 vorherigen Operationen auf der heterolateralen Seite.</li> <li>• Platzierung des Bandes durch Zug. Ein Abstand von ca. 1 cm muss zwischen dem Band und der Harnröhre eingehalten werden.</li> <li>5. • Durchtrennung des Bandes am Hautansatz in Höhe der Schließmuskeleinschnitte. Hämostase wird nach Regulierung des Bandes überprüft.</li> <li>• Schließung der Scheidenwand durch Kreuzstich mit resorbierendem Faden und Schließung der eingeschnittenen Haut.</li> </ol> <hr/> <p>La sistemazione della paziente, l'anestesia e l'infiltrazione vengono effettuate come indicato alla pagina delle «informazioni preliminari 1-2-3».</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incisioni trans-otturatrici di circa 1 cm per parte situate al massimo ad 1 cm sopra la linea orizzontale passante per il meato uretrale e a 1 cm dalla frattura ischio-pubica.</li> <li>2. Incisione vaginale e dissezione uretro-vaginale.</li> <li>3. Passaggio dello strumento elicoidale per via transotturatoria (azzurro manico) (lo strumento viene introdotto in una delle incisioni transottutarorie).</li> <li>4. • Aggraffatura della bandella LIFT® sull'ago.</li> <li>• Passaggio della bandella; in seguito passaggio controlaterale : realizzazione delle 3 precedenti operazioni sul lato controlaterale.</li> <li>• Posizionamento della benda mediante trazione, dovendo lasciare uno spazio di circa 1 cm tra la benda e l'uretra.</li> <li>5. • Sezione della bandella rasopelle a livello delle incisioni; L'emostasi viene verificata dopo la regolazione della bandella.</li> <li>• Chiusura della parete vaginale mediante sopraggitto incrociato con filo riassorbibile e chiusura delle incisioni cutanee.</li> </ol>
--	---

en

fr


de

it

**Via transobturatriz**  
**Via transobturadora out-in**

	<p>La instalación de la paciente, la anestesia y la infiltración se realizarán tal y como se indica en la página «informaciones preliminares 1-2-3».</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incisiones trans obturadoras/transobturatoricas de aproximadamente 1 cm cada una situadas como máximo a 1 cm por encima de la línea horizontal pasando por el meato urinario y a 1 cm de la rama isquiopubiana.</li> <li>2. Incisión vaginal y disección uretro-vaginal.</li> <li>3. Paso de la instrumentación del ancilar helicoidal por vía transobturatriz (manguito azul) s obturador (la instrumentación ancilar se introduce en una de las incisiones trans obturador).</li> <li>4. • Colocación de la venda LIFT® en la aguja. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paso de la venda ; y paso contra-lateral: realización de las 3 operaciones anteriores del lado contro-lateral.</li> <li>• Colocación de la banda por tracción sobre el hilo. Debe respetarse un espacio de aproximadamente 1 cm entre la banda y la uretra.</li> </ul> </li> <li>5. • Sección de la venda a ras de la piel a nivel de las incisiones; La hemostasis se comprueba tras ajustar la venda. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre de la pared vaginal mediante sutura cruzada con hilo reabsorbible y cierre de las incisiones cutáneas</li> </ul> </li> </ol>	es
	<p>A preparação da paciente, a anestesia e a infiltração foram efetuadas conforme indicado na página «informações preliminares 1-2-3».</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incisões transobtadoras de cerca de 1 cm, cada uma situada no máximo a 1 cm acima da linha horizontal passando pelo meato uretral e a 1 cm do orifício isquiopúbico.</li> <li>2. Incisão vaginal e dissecção uretrovaginal.</li> <li>3. Passagem do acessório helicoidal (cabو azul) por via transobturadora (o acessório é introduzido numa das incisões transobtadoras).</li> <li>4. • Fixação da tela LIFT® na agulla. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passagem da tela; seguidamente passagem contralateral: realização das 3 operações anteriores do lado contralateral.</li> <li>• Colocação da tela por tração: é necessário respeitar um espaço de cerca de 1 cm entre a tela e a uretra.</li> </ul> </li> <li>5. • Secção da tela rente à pele ao nível das incisões. A hemostase é verificada após ajuste da tela. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suturar a incisão vaginal com um fio absorvível e sutura das incisões cutâneas.</li> </ul> </li> </ol>	pt

**Via transobturatora out-in**  
**Εκ των έξω προσέγγιση δια του θυροειδούς τρήματος**  
**Transzobturátoros megközelítés, out-in**  
**Transobturatorbenadering uit-in**  
**Dojście transobturacyjne out-in**  
**Transobturatorny postup výstup-vstup**

	<p>Η εγκατάσταση του ασθενούς, η αναισθησία και η διήθηση πρέπει να εκτελούνται όπως περιγράφεται στη σελίδα «Προκαταρκτικές πληροφορίες»</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Αμφοτερόπλευρη διέλευση των κυρτών βοηθητικών στον χώρο του Retzius για την τοποθέτηση της ταινίας υποστήριξης LIFT®.</li> <li>Ο κυστεοκοπικός έλεγχος πραγματοποιείται μετά τη διέλευση των καλωδίων σε κάθε πλευρά χωρίς να έχει εισχωρήσει η ταινία στους ιστούς.</li> <li>Τοποθέτηση της ταινίας.</li> <li>Η προσαρμογή της τάσης μπορεί να γίνει με προσπάθεια πρόκλησης βήχα.</li> <li>Κόψτε την ταινία κοντά στο δέρμα. Η αμόσταση ελέγχεται μετά την προσαρμογή της ταινίας. Ράψτε την κολπική τομή με απορροφήσιμο νήμα, καθώς και τις δερματικές τομές.</li> </ol> <p>A beteg elhelyezése, előkészítése és érzéstelenítése az "előzetes információk" rész szerint történik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Az obturátor bemetszések megközelítőleg 1 cm-esek minden, körülbelül 1 cm-el a vízszintes vonal felett, ami az urethralis meatus-nál halad el, 1 cm-re ischiopubikus ágtól.</li> <li>Vaginális bemetszés és urethra-vaginális bevágás..</li> <li>Az obturátoron át juttassa be a spirális felhelyezőt (kék fogó) a tunnelling device az egyik obturátor bemetszésbe helyezendő.</li> <li>Rögzítse a SOFT LIFT® hálót a tűrő.</li> <li>A szalag bejuttatása és a heterolaterális bejuttatás: a 3 előző lépés végrehajtása a heterolaterális oldalon. A szalagot a fonal meghúzássával helyezzük el. Körülbelül 1 cm-es helyen kell maradnia a szalag és az Urethra között.</li> <li>Vágja el a szalagot, egy szintben a bőrrel a bemetszések könyrékén. A homeosztázist a szalag megfeszítése után ellenőrizze. • A vaginalis fal lezárása kereszttöltsékkel, felszívódó fonallal és bőr bemetszésének zárása.</li> </ol> <p>Installatie van de patiënt, anesthesie en infiltratie uitgevoerd zoals gespecificeerd op de bladzijde „Voorafgaande informatie 1-2-3“</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Transobturatorincisions van elk ongeveer 1 cm, ten minste 1 cm boven de horizontale lijn aangebracht die langs de urethrale meatus passeert, op 1 cm van de ischiopubische ramus.</li> <li>Vaginale incisie in urethrovaginale dissectie.</li> <li>Doorgang van de Schroefvormige hulpuitrusting via de transobturator (blauwe hendel) (het tunnelapparaat wordt in een van de transobturatorincisions ingebracht).*</li> <li>Vasthouden van het LIFT®-verband op de naald. - Doorgang van de band en heterolaterale doorsteek: uitvoering van de 3 vorige operaties aan de heterolaterale kant. - De band wordt op zijn plaats gebracht door aan de draad te trekken. Er dient ongeveer één centimeter ruimte tussen de band en de uretha te blijven.</li> <li>• De band afsnijden, effen op de huid ter hoogte van de incisies. Na het aanspannen van de band wordt de hemostase gecontroleerd Sluiten van de vaginalen wand middels een gekruiste naad met absorbeerbare draad en sluiting van de huidincisie</li> </ol> <p>Ułożenie pacjentki, anestezja i infiltracja są wykonywane zgodnie ze wskazaniem na stronie „informacje wstępne 1-2-3“</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nacięcia transobturacyjne około 1 cm każde, usytuowane maksymalnie 1 cm powyżej poziomej linii przechodzącej przez wyłot cewki moczowej i w odległości 1 cm od gałęzi kulszowo-lonowej.</li> <li>Nacięcie pochwy i dysekcja cewkowo-pochwowa.</li> <li>Przejście spiralnego wspomagania przez dojście transobturacyjne (uchwyt niebieski). (Wspomaganie jest wprowadzone do jednego z nacięć transobturacyjnych). • Zaczepienie taśmy LIFT® do igły - Przeprowadzenie taśmy; następnie przeprowadzenie kontralateralne: wykonanie 3 poprzednich operacji po stronie kontralateralnej. - Umieszczenie taśmy przez ciągnienie: należy przestrzegać odległości 1 cm między taśmą i cewką moczową.</li> <li>- Przecinanie taśmy równe ze skórą na poziomie nacięć. Zatrzymanie krwawienia sprawdzane jest po ustawnieniu taśmy. • Zamknięcie ślejanki pochwy szwem krzyżowym nićią wchlaniąłna i zamknięcie nacięć skórnego.</li> </ol> <p>Anestezie pacienta má být provedena ak je uvedeno na stránce "Předbežná opatření 1-2-3".</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Transobtúrární incise zhruba 1 cm, 1 cm nad horizontální liní procházející měchýřem 1 cm od stydé kosti.</li> <li>Vaginální řez a uetrovaginální oddělení tkání.</li> <li>Průchod šroubovým zařízením pomocí trasobutrárního zařízení (modrá rukojet''). (tunelovací zařízení se zasune do jednoho z transobtúrárních řezů).</li> <li>•Zavěšení bandáže LIFT® na jehlu. • Prosunutí pásky; a heterolaterální průchod: provedení 3 předchozích operací na heterolaterální straně. • Páska se aktivuje zatlačením na očko. Mezi páskou a měchýřem musí zůstat prostor zhruba jeden centimetr</li> <li>. Odřízněte pásku, na místě řezů zakryjte kůži. Po uťažení pásky je třeba zkrolovat hemostázi. Uzavření vaginalní stěny křížovým stehem za použití vstřebatelné nitě a uzavření řezů</li> </ol>
--	--

ελ  
hu  
nl  
pl  
sk

## Transobturární prístup vstup-výstup- Abordarea transobturatoră out-in

	<p>Inštalácia, anestézia a infiltrácia sa vykonajú tak, ako je uvedené na strane nazvanej «Predbežné opatrenia 1-2-3»</p> <p>1. Transobturatorny rez v dĺžke približne 1 cm, umiestnený minimálne 1 cm nad vodorovnou čiarou prechádzajúcou od ústia močovej trubice, 1 cm od ischiopublické vety.</p> <p>2. Vaginálne rez a uretvaginálny rez.</p> <p>3. Priechod špirálovou vedľajšej časti (modré madlo). (zariadenia na tunelovanie sa zadúne do jedného z rezov).</p> <p>4. Zaseknutie bandáže LIFT® do ihej.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Priechod pásky: a heterolaterálni priechod, prevedenie 3 predchádzajúcich krokov na heterolaterálni strane.</li><li>- Páska sa nasadí zatiahnutím za závit. Medzi rezom a mechúrom musí zostať priestor zruba jeden centimeter.</li></ul> <p>5. • Pásku odrezte, vyrovnejte sa zárezom. Po napnutie pásky sa skontroluje hemostázy.</p> <p><b>Zatvorenie vaginalnej steny križovým stehom, vstrebateľnými stehy a zatvorenie kožného rezu.</b></p> <p>Instalarea pacientului, anestezia și infiltrarea efectuate conform specificațiilor în pagina denumită «Informații preliminare 1-2-3»</p> <p>1. Incizii transobturatoră de aproximativ 1 cm fiecare, poziționate la cel puțin 1 cm deasupra liniei orizontale care trece pe langa meatus uretral la 1 cm de ramura ischiopubiană.</p> <p>2. Incizie vaginală și disecție uretro-vaginală.</p> <p>3. Trecerea accesoriului elicoid prin intermediu trans-obturatorului (maner albastru). (dispozitivul de tunel este introdus într-o din inciziile trans-obturatoră).</p> <p>4. • Prinderea bandajului LIFT® pe ac.</p> <p>5. • Trecerea benzii; și trecerea heterolaterală: efectuarea celor 3 operații anterioare pe partea heterolaterală.</p> <p>6. • Banda se desfășoară trăgând de fir. Ar trebui să rămână un sprijin de aproximativ un centimetru între bandă și uretra.</p> <p>7. • Tăierea benzii, la nivel cu pielea la nivelul inciziilor. Hemostaza este verificată după tensiunea benzii.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Închiderea peretelui vaginal printr-o sutură încrucișată cu fir absorbabil și închiderea inciziei cutanate.</li></ul>	CS RO
--	--	----------

## **NOTES:**

## **NOTES:**

## **NOTES:**



		
en	Website adress for consultation of electronic instructions for use and summary of safety and clinical performances	
fr	Adresse du site web pour la consultation des instructions électroniques d'utilisation et le résumé des performances cliniques et de sécurité	
de	Website-Adresse zur Einsichtnahme in die elektronische Gebrauchsanweisung und Kurzbericht über Sicherheit und klinische Leistung	
it	Indirizzo del sito web per la consultazione elettronica delle istruzioni per l'uso e del riepilogo delle prestazioni cliniche e di sicurezza	
es	Dirección del sitio web para consultar las instrucciones de uso en formato electrónico y el resumen del rendimiento clínico y de seguridad	
pt	Site para consulta das instruções eletrónicas de utilização e o resumo dos desempenhos clínicos e de segurança	
ελ	Διεύθυνση του ιστοτόπου στον οποίο μπορείτε να ανατρέξετε για τελεκτρονικές οδηγίες χρήσης και μια περιληψη των κλινικών επιδόσεων και της ασφάλειας	
hu	Az elektronikus használati útmutató és a klinikai és biztonsági teljesítmények összefoglalójának webcím	
.nl	Url van de website voor het raadplegen van de elektronische gebruiksinstructies en het overzicht van klinische prestaties en veiligheid	
pl	Adres strony internetowej do przeglądania elektronicznych instrukcji obsługi i podsumowania wyników klinicznych i bezpieczeństwa	
cs	Adresa internetových stránek, kde lze konzultovat uživatelské pokyny v elektronické podobě a souhrn klinických a bezpečnostních výkonů	
sk	Adresa internetových stránok, kde možno konzultovať užívateľské pokyny v elektronickej podobe a súhrn klinických a bezpečnostných výkonov	
ro	Adresa site-ului web pentru consultarea instrucțiunilor electronice de utilizare și rezumatul performanțelor clinice și de siguranță	
en	CE mark and identification number of Notified Body. Product conforms to essential requirements of the Medical device directive 93/42/EEC	
fr	Marque CE et numéro d'identification de l'organisme notifié. Produit conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE	
de	CE-Kennzeichnung und Identifikationsnummer der benannten Stelle. Produkt entspricht grundlegenden Anforderungen der Richtlinie für Medizinische Geräte 93/42/EWG	
it	Marchio CE e numero di identificazione dell'ente notificato. Prodotto conforme ai requisiti essenziali della direttiva sui dispositivi medici 93/42/EEC	
es	Marca CE y número de identificación del organismo notificado. El producto está conforme con los requerimientos de la directiva 93/42/EEC sobre aparatos médicos.	
pt	Marca CE e número de identificação do Organismo Notificado. O produto obedece aos principais requisitos da Diretiva 93/42/CEE	
ελ	Σήμανση CE και αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου φορέα. Το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/EEC για τα αιτιοτεχνολογικά προϊόντα.	
hu	CE szám és az kiállító szervezet száma. A termékek megfelelnek az orvosi eszközökre vonatkozó 93/42/EEC előírásoknak.	
nl	CE-markering en identificatiecijfer van de aangemelde instantie. Product voldoet aan de essentiële eisen van de richtlijn 93/42/EEG	
pl	Znak CE i numer identyfikacyjny uprawnionego organu. Produkt zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 93/42/CEE	
sk	CE značka a číslo označenie. Produkt splňa základné požiadavky smernice 93/42/CEE	
cs	Značka CE a identifikační číslo příslušného úřadu. Produkt splňuje základní požadavky směrnice pro lékařská zařízení 93/42/EEC.	
ro	Marcajul CE si numărul de identificare al organizației notificate. Produsul respectă cerințele esențiale ale Directivei privind dispozitivele medicale 93/42/EEC	

en fr de it es pt el ro	- Symbols used on labelling - Symboles utilisés sur l'étiquette - Bei Etiketten verwandte Symbole - Simboli utilizzati sull'etichetta - Símbolos utilizados en el etiquetaje - Símbolos usados na etiqueta - Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις ετικέτες	hu .nl pl cs sk ro	- Felhasznált szimbólumok - Op de etikettering gebruikte symbolen - Symbole stosowane na etykiecie - Symboly použité na štítku - Symboly použité na štítkoch - Simboluri utilizate pe etichetare			e-IFU <a href="http://www.cousin-biotech.com/ifu">www.cousin-biotech.com/ifu</a>
						IFU can be downloaded through the QR code. A hard copy can be sent within 7 days on request by email to <a href="mailto:ifurequest@cousin-biotech.com">ifurequest@cousin-biotech.com</a> or by using the order form on our website.

	en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	Batch number Numéro de lot Chargennummer Número di lotto Número de lote Número do lote Αριθμός παρτίδας Tétel szám Batchnummer Numer partii Číslo Šarže Číslo Šarže Numarul lotului			en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	Caution (see instructions for use) Attention (voir la notice d'instructions) Vorsicht (Gebrauchsanweisung beachten) Attenzione (Leggere attentamente le istruzioni) Precaución (Ver instrucciones de uso) Atenção (Consultar nota de instruções) Προσοχή (Δείτε τις οδηγίες χρήσης) Vigyázat (lásd használati útmutató) Zie gebruiksinstructies Uwaga, patrz instrukcja obsługi Viz pokyny k použití Pozite pokyny na použitie Avertisment (vezi instructiunile de utilizare)
	en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	Reference on the brochure Référence du catalogue Verweis auf der Broschüre Referimento del catalogo Referencia al folleto Referéncia do catálogo Αριθμός καταλόγου Catalógs referencia Referentie in de brochure Symbol katalogowy Odkaz v brožúre Referencie v návode Referenčná pe brošuřa			en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	Manufacturer Fabricant Hersteller Produttore Fabricante Fabricante Κατασκευαστής Gyártó Fabrikant Producent Výrobce Výrobcu Producator
	en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	Do not re-use Ne pas réutiliser Nicht wiederverwenden Non riutilizzare No volver a utilizar Não reutilizar Να μην επαναχρησιμοποιείται Ne használja újra Niet hergebruiken Nie stosować ponownie Nepoužívat znovu Nepoužívať opakovane Nu reutilizati			en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	Use before: year and month Utiliser jusque : année et mois Verbrauchen bis : Jahr und Monat Utilizzare entro e non oltre: anno e mese Úsese antes de: año y mes Utilizar até : ano e mês Ημερομηνία λήξης: έτος και μήνας Lejárat: év, hónap Te gebruiken vóór: jaar en maand Stosować do: rok i miesiąc Spotřebovat do: rok a měsíc Spotrebovať do: rok a mesiac Folositi înainte de: an și luna de utilizare
	en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	Keep in a dry place Conserver au sec Trocken lagern Conservare in un luogo asciutto Manténgase en un lugar seco Manter em lugar seco Φυλάξτε το προϊόν μακριά από την υγρασία Száraz helyen tartandó Op een droge plaats bewaren Przechowywać w suchym miejscu Uchovávejte na suchém miestě Uchovajte na suchom mieste Pastrati in loc uscat			en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	Do not use if the packaging is damaged Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé Nicht verwenden, wenn Packung beschädigt ist Non utilizzare se la confezione è danneggiata No usar si el embalaje está dañado Não usar se a embalagem estiver danificada Να μην επαναποτείσται, εάν η συσκευασία έχει υποστεί κάποια βλάβη Ne használja fel, ha sérült a csomagolás Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone Nepoužívejte je-li obal poškozený Nepoužívať ak je obal poškodený Nu utilizati dacă ambalajul este deteriorat
	en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	Keep away from sunlight Conserver à l'abri de la lumière du soleil Vor Sonnenlicht geschützt lagern Conservare al riparo dalla luce solare Mantener alejado de la luz solar Manter ao abrigo da luz solar Προφυλάξτε το προϊόν από το ηλιακό φως Óvjá a közvetlen napfénytől Vrij van licht houden Przechowywać w miejscu chronionym przed światłem Uchovávejte mimо dosah světla Skladujte na tmavom mieste Tíneti deparate de lumina soarelui			en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	Do not re-sterilize Ne pas restériliser Nicht erneut sterilisieren Non risterilizzare No volver e esterilizar Não reesterilizar Να μην επαναποστειρώνεται Ne sterilizálja újra Niet opnieuw steriliseren Nie sterylizować ponownie Znovu nesterilizujte Znovu nesterilizujte Nu re-sterilizati
	en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	Double sterile barrier system Double barrière stérile Doppel-Sterilbarriere Doppia barriera sterile Doble barrera estéril Sistema duplo de barreira estéril Διπλό αποστειρωμένο φράγμα Dupla steril gát Dubbele steriele barrière Podwójna bariera sterylna Dvojitá sterilní bariéra Dvojitá sterilná bariéra Dublă barieră sterilă			en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	Medical device Dispositif medical Medizinprodukt Dispositivo medico Producto sanitario Dispositivo médico Ιατρική συσκευή Orvosteknai eszköz Medisch hulpmiddel Urządzenie medyczne Zdravotnický prostředek Zdravotnícka pomôcka Dispositiv medical

	en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	Manufacturing date Date de fabrication Herstellungsdatum Data di fabbricazione Fecha de fabricación Data de fabrico Ημερομηνία κατασκευής Gyártási dátum Fabricagedatum Data produkcji Datum výroby Dátum výroby Data fabricației		en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	Patient name Nom du patient Name des Patienten Nome del paziente Nombre del paciente Nome do paciente Όνομα ασθενούς A beteg neve Naam van de patiënt Imię i nazwisko pacjenta Jméno pacienta Meno pacienta Numele pacientului			
	en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	Name of practitioner Nom du médecin Name des Arztes Nome del medico Nombre del médico Nome do médico Όνομα ιατρού Az orvos neve Naam van de arts Imię i nazwisko lekarza Jméno lékaře Meno lekára Numele medicului			en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	Unique device identification Numéro d'identifiant unique Einmalige Identifikationsnummer Identificazione unica del dispositivo Número de identificación única Número de identificação único Μοναδικός εργαθός αναγνώρισης Egyedi azonosító szám Uniek identificatienummer Unikálny numer identifikacyjny Jedinečné identifikační číslo Jedinečné identifikačné číslo Număr de identificare unic		
	en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	Date of surgical procedure Date de l'intervention Datum des Eingriffs Data dell'intervento Fecha de la intervención Data da intervenção Ημερομηνία της επέμβασης A beavatkozás dátuma Datum van de ingreep Data interwencji Datum zákroku Dátum zákroku Data intervenciei			en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	MR Safe Compatible IRM MRT-kompatibel Compatibile con IRM Compatible con IRM Compatível IRM Συμβατό με MRI MRI-kompatibilis MRI-compatibel MRI-compatibel Kompatibilní s MRI Kompatibilné s MRI Compatibil RMN		
	en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	Sterilized by ethylene oxide Produit stérile. Méthode de stérilisation: oxyde d'éthylène Mit Ethylenoxid sterilisiert Sterilizzato all'ossido di etilene Esterilizado con óxido de etileno Produto estéril. Método de esterilização: óxido de etileno Στερίπτροιόν. Μέθοδος αποστείρωσης: αιθυλενοξείδιο Etilén-oxidossal sterilizálva Gesteriliseerd met ethyleenoxide Sterylizowany tlenkiem etylenu Sterilizované etylenoxidom Sterilizované etylenoxidom Sterilizat cu Oxid Etilenă			en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro			
	<b>UDI-DI:</b>				<b>Qty:1</b>			
en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	Unique device identification - device identifier Identification unique du dispositif - identifiant du dispositif Eindeutige Produktidentifikation - Produktkennung Identificazione unica del dispositivo - identificativo del dispositivo Identificación única del dispositivo - identificador del dispositivo Identificaçā unica do dispositivo - número de identificação do dispositivo Μοναδική ταυτοτοίηση της συσκευής - αναγνωριστικό της συσκευής Az eszköz egyedi azonosítása - az eszköz azonosítója Unieke identificatie van het hulpmiddel - identificatiecode van het hulpmiddel Unikalna identyfikacja urządzenia - identyfikator urządzenia Jedinečná identifikace prostředku - identifikační číslo prostředku Jedinečná identifikácia pomôcky - identifikačné číslo pomôcky Număr unic de identificare a dispozitivului - codul de identificare al dispozitivului			en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	Number of implants in the packaging = Qty: Nombre d'implant dans l'emballage = Qté: Anzahl der Implantate in der Packung = Anz.: Número di impianti nella confezione = Qtà: Número de implante en el embalaje = Cant.: Número de implantes na embalagem = Qtd: Αριθμός εμφυτευμάτων στην συσκευασία = Ποσότητα: A csomagolásban lévő implantátumok száma = Menny: Aantal implantaten in de verpakking = aantal Liczba implantów w opakowaniu = Ilosć: Počet implantátů v balení = Množ.: Počet implantátov v balení = Množ.: Numărul de implanturi în ambalaj = Cantitate			
	<b>Mat    PP    PET    DYE    DMS</b>							
en fr de it es pt el hu .nl pl cs sk ro	Polypropylene, polyethylene terephthalate, biocompatible dye, dimethyl siloxane Polypropylène, polyéthylène téréphtalate, colorant biocompatible, diméthyle siloxane Polypropylen, polyethylenterephthalat, biokompatibler Farbstoff, Dimethylsiloxan Polipropilene, polietilene tereftalato, colorante biocompatibile, dimetil siloxano Polipropileno, polietileno tereftalato, colorante biocompatibile, polidimetilsiloxano Polipropileno, polietileno tereftalato, colorante biocompatibile, dimetilpolisiloxano Πολυπροπυλένιο, Τερεφθαλικό πολυαθυλένιο, βιοσυμβατή χρωστική συσία, διμεθυλοσιλοξάνη Polipropilén, Polietilén tereftalát, biokompatibilis festék, dimetil szíloxán Polypropyleen, polyethylentereftalat, biocompatibile kleuring, dimethylsiloxaan Polipropilen, tereftalan polietilenu, barník biokompatybilny, dwumetyl siloksanu Polypropylen, polyetylénnaftalát, biokompatibilní barvivo, dimetylsiloxan Polypropylén, polyetylén tereftalát, biokompatibilne barvivo, dimetyl siloxan Polipropilená, polietilen tereftalat, colorant biocompatibil, dimetil siloxan							